

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
17 серпня 2021 року № 1723

(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України від 11
листопада 2021 року № 2503)

Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Лікарські засоби для
забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу
Віллебранда»

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	ампули, флакони, шприци	500 МО	лікування хворих з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	-“-	1000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	500 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	1000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	1500 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	2000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	-“-	3000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	-“-	500 МО та/або 600 МО	лікування хворих з гемофілією типу В
Фактор коагуляції	-“-	1000 МО	-“-

крові людини ІХ (плазмовий)		та/або 1200 МО	
Фактор коагуляції крові людини ІХ (рекомбінантний)	-“-	500 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини ІХ (рекомбінантний)	-“-	1000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	-“-	500 МО	лікування хворих з хворобою Віллебранда
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	ампули, флакони, шприци	1000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	-“-	500 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	-“-	1000 МО	-“-
Десмопресин	-“-	15 мкг/мл, 1 мл	лікування хворих з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу А
Ептаког-альфа активованій (рекомбінантний фактор VIIa)	-“-	2 мг (100 КМО)	лікування пацієнтів з інгібіторними формами гемофілії типу В

			та А та лікування кровотеч і їх профілактика при хірургічних втручаннях або при інших інвазивних процедурах
Ептаког-альфа активований (рекомбінантний фактор VIIa)	-“-	5 мг (250 КМО)	-“-
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-“-	500 МО	лікування пацієнтів з інгібіторною формою гемофілії типу В та гемофілії типу А з помірними кровотечами у режимі лікування «на вимогу»
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-“-	1000 МО	-“-
Еміцизумаб	-“-	30 мг	лікування пацієнтів з інгібіторною формою гемофілії типу А у режимі профілактики
Еміцизумаб	-“-	60 мг	-“-
Еміцизумаб	-“-	105 мг	-“-
Еміцизумаб	-“-	150 мг	-“-

**Заступник Міністра
охорони здоров'я**

Петро ЄМЕЦЬ