

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2015 р. №

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовою	Форма випуску, сила дії лікарського засобу
1	2
1. АНЕСТЕТИКИ	
1.1 Загальні анестетики та кисень	
1.1.1 Інгаляційні лікарські засоби	
Галотан (Halothane)	Інгаляція
Ізофлуран (Isoflurane)	Інгаляція
Азоту закис (Nitrous oxide)	Інгаляція
Кисень (Oxygen)	Інгаляція (медичний газ).
1.1.2 Ін'єкційні лікарські засоби	
Кетамін (Ketamine)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг (у вигляді гідрохлориду)/мл по 10 мл у флаконі.
Пропофол (Propofol*)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл; 20 мг/мл. *Тіопентал може бути використаний в якості альтернативи в залежності від наявності і вартості.
1.2 Місцеві анестетики	
☐ Бупівакаїн (Bupivacaine)	Розчин для ін'єкцій: 0,25% (гідрохлорид); 0,5% (гідрохлорид). [-] Розчин для спінальної анестезії: 0,5% (гідрохлорид) по 4 мл в ампулах, потрібно розвести з 7,5% розчином глюкози
☐ Лідокаїн (Lidocaine)	Розчин для ін'єкцій: 2% (гідрохлорид); [-] Розчин для ін'єкцій: 1% (гідрохлорид); [-] Розчин для спінальної анестезії: 5% (гідрохлорид) по 2мл в ампулах, потрібно розвести з 7,5% розчином глюкози [-] Локальні форми: 2% - 4% (гідрохлорид)
[-] Лідокаїн+епінефрин (адреналін)	[-] Стоматологічний картридж: 2% (гідрохлорид) + епінефрин 1:80 000. [-] Розчин для ін'єкцій: 1%; 2% (гідрохлорид або сульфат) + епінефрин 1: 200 000 у флаконі.
Додатковий перелік	
[-] Ефедрин (Ephedrine)	[-] Розчин для ін'єкцій: 30 мг (гідрохлорид)/мл у 1-мл амп. Для спинномозкової анестезії під час пологів з метою профілактики запобігання гіпотензії.
1.3 Передопераційна підготовка та забезпечення короткотривалих процедур	
Атропін (Atropine)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг (сульфат) у ампулах по 1мл.

<i>[-]</i> ☐ Мідазолам (Midazolam)	<i>[-]</i> Розчин для ін'єкцій: 1 мг/мл. <i>[-]</i> Розчин для перорального застосування: 2 мг/мл <i>[d]</i> <i>[-]</i> Таблетки: 7.5 мг; 15 мг
Морфін (Morphine)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг (гідрохлорид) у ампулах по 1мл.
2. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ ТА НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ	
2.1 Неопіоїдні та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НСПЗЛЗ)	
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)	Таблетки: 100 мг - 500 мг. <i>[-]</i> Супозиторії: 50 мг до 150 мг
Ібупрофен (Ibuprofen) ☒	Розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл; Таблетки 200 мг; 400 мг; 600мг ☒ Не для дітей віком до 3 місяців.
Парацетамол (Paracetamol) *	Розчин для перорального застосування: 120 мг/5 мл. Супозиторії: 100 мг Таблетки: 100 мг - 500 мг. * Не рекомендується для протизапального застосування через відсутність доведеної ефективності такого ефекту.
2.2 Опіоїдні анальгетики	
Кодеїн (Codeine)	Таблетки: 30 мг (фосфат).
Морфін (Morphine)* * - альтернативними засобами є гідроморфон і оксикодон	Розчин для ін'єкцій: 10 мг (морфіну гідрохлорид) по 1 мл у ампулах. Таблетки: 10 мг (морфіну сульфат). <i>[-]</i> Розчин для перорального застосування: 10 мг (морфіну гідрохлорид або морфіну сульфат)/5 мл <i>[-]</i> Таблетки (пролонгованого вивільнення): 10мг - 200 мг (морфіну сульфат або гідрохлорид) <i>[-]</i> Гранули (з повільним вивільненням; змішати з водою): 20 мг до 200 мг (морфіну сульфат).
2.3 Лікарські засоби, для симптоматичної терапії у паліативній допомозі	
Амітриптилін (Amitriptyline)	Таблетки: 25 мг; <i>[-]</i> Таблетки: 10 мг; 75 мг
Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл по 1мл в ампулі (у вигляді динатрієвої солі фосфату). <i>[-]</i> Таблетки: 2 мг <i>[d]</i> ; Таблетки: 4 мг, 0,5 мг, 1 мг <i>[-]</i> Розчин оральний: 2 мг/5 мл
<i>[-]</i> Циклізин (Cyclizine) <i>[d]</i>	<i>[-]</i> Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл <i>[-]</i> Таблетки: 50 мг
Діазепам (Diazepam)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг/мл. Таблетки: 5 мг; 10 мг. <i>[-]</i> Розчин пероральний: 2мг/5 мл <i>[-]</i> Розчин ректальний: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг
<i>[-]</i> Докузат натрію (Docusate sodium)	<i>[-]</i> Капсули: 100 мг <i>[-]</i> Розчин оральний: 50 мг/5 мл.
Флуоксетин (Fluoxetine) ☒	Тверда пероральна лікарська форма: 20 мг (у вигляді гідрохлориду). ☒ > 8 років.
Галоперидол (Haloperidol)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг по 1мл в ампулах. Тверда оральна лікарська форма: 5 мг. <i>[-]</i> Оральна рідина: 2 мг/мл <i>[-]</i> Тверда оральна лікарська форма: 0.5 мг; 2 мг

Гіосцин бутилбромід (Butylscopolamine)	Розчин для ін'єкцій: 20 мг/мл по 1 мл в ампулах.
<i>[-] Гіосцину гідробромід (Hyoscine hydrobromide) [ð]</i>	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 400 мкг/мл; 600 мкг/мл [-] Пластир трансдермальний: 1 мг/72 години</i>
Лактулоза (Lactulose) [д]	Розчин оральний: 3,1-3,7 г/5мл.
Лоперамід (Loperamide)	Тверді оральні лікарські форми: 2 мг.
Метоклопрамід (Metoclopramide)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах. Тверда оральна лікарська форма: 10 мг (гідрохлорид). <i>[-] Оральний розчин: 5мг/5мл</i>
<i>[-] Мідазолам (Midazolam)</i>	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 1 мг/мл, 5мг/мл. [-] Розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [ð]. [-] Таблетки: 7.5 мг; 15 мг</i>
Ондансетрон (Ondansetron) [д] ☒	Розчин для ін'єкцій: 2 мг /мл по 2 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду). Таблетки: 4 мг; 8 мг. ☒ > 1 місяця.
Сенна (Senna)	<i>[-] Оральний розчин: 7.5 мг/5 мл.</i>
3. ПРОТИАЛЕРГІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ АНАФІЛАКСІЇ	
Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі динатрію фосфату).
Епінефрин/ Адреналін/(Epinephrine/Adrenaline)	Розчин для ін'єкцій: 1,8 мг (у вигляді гідротартрат) по 1 мл в ампулах. <i>[-] Розчин для ін'єкцій: 1 мг (у вигляді гідрохлориду гідротартрату) в 1-мл ампулі</i>
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі.
Лоратадин (Loratadine)*	Оральний розчин: 1 мг/мл. Таблетки: 10 мг. *седативні антигістамінні препарати можуть використовуватися для обмежених показань.
Преднізолон (Prednisolone)	Таблетки: 5 мг. <i>[-] Таблетки: 25 мг. [-] Оральний розчин: 5мг/мл [ð]</i>
4. АНТИДОТИ ТА ІНШІ РЕЧОВИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОТРУЄННІ	
4.1 Неспецифічні	
Вугілля активоване (Medicinal charcoal)	Порошок для перорального застосування.
4.2 Специфічні	
Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 200 мг/мл у 10-мл амп. [-] Оральний розчин: 10% [ð], 20% [ð]</i>
Атропін (Atropine)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг (сульфат) по 1 мл в ампулах.
Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл по 10 мл в ампулах.
<i>[-] Метилтионіну хлорид/Метиленовий синій (Methylthionium chloride/Methylene blue)</i>	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл у 10-мл амп.</i>
Налоксон (Naloxone)	Розчин для ін'єкцій: 400 мкг (гідрохлорид) по 1 мл в ампулах.
Пеніциламін (Penicillamine)	Тверді оральні форми: 250 мг.
<i>[-] Калій-залізо гексаціаноферрат (II) (Potassium ferric hexacyano-ferrate(II) - 2H2O (Prussian blue))</i>	<i>[-] Порошок для перорального застосування</i>

<i>[-] Натрію нітрит (Sodium nitrite)</i>	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 30 мг/мл у 10-мл амп.</i>
<i>[-] Натрію тіосульфат (Sodium thiosulphate)</i>	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 250 мг/мл у 50-мл амп.</i>
Додатковий перелік	
<i>[-] Дімеркапрол (Dimercaprol)</i>	<i>[-] Розчин для ін'єкцій олійний: 50 мг/мл у 2-мл амп.</i>
<i>[-] Натрію, Кальцію еденат (Sodium, Calcium edentate)</i>	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 200 мг/мл у 5-мл амп.</i>
<i>[-] Сукцимер (Succimer)</i>	<i>[-] Тверді оральні форми: 100 мг</i>
<i>[-] Фомепізол (fomepizole)</i>	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 5 мг / мл (сульфат) в 20-мл ампулі або 1 г / мл (основа) в 1,5-мл ампулі.</i>
<i>[-] Дефероксамін (Deferoxamine)</i>	<i>[-] Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг.</i>
5. АНТИКОНВУЛЬСАНТИ/ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ	
Карбамазепін (Carbamazepine)	Суспензія оральна: 100 мг/5 мл. Таблетки (ділимі): 200 мг <i>[-] Таблетки (жувальні, ділимі): 100 мг</i>
Діазепам (Diazepam)	<i>[-] Гель або ректальний розчин: 5 мг/мл у тубах по 0.5 мл; по 2 мл; по 4 мл</i>
<i>[-] Лоразепам (Lorazepam)</i>	<i>[-] Парентеральні форми: 2 мг/мл у 1-мл амп.; 4 мг/мл у 1-мл амп.</i>
Магнію сульфат (Magnesium sulphate)*	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 500 мг/мл по 2 та 10 мл в ампулах; * Для використання при еклампсії та важкій пре-еклампсії, не використовувати при інших конвульсивних розладах.</i>
Фенобарбітал (Phenobarbital)	Таблетки: 15 мг - 100 мг (50 мг та 100мг) <i>[-] Розчин для ін'єкцій: 200 мг/мл (натрій) [-] Розчин для перорального застосування: 15 мг/5 мл.</i>
Фенітоїн (Phenytoin)	Таблетки: 117 мг <i>[-] Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл у 5-мл у фл. (сіль натрію) [-] Розчин для перорального застосування: від 25 мг до 30 мг/5 мл.* [-] Тверді оральні форми: 25 мг; 50 мг; 100 мг (сіль натрію) [-] Таблетки (жувальні): 50 мг *Наявність на ринку дозування 25 мг/5 мл та 30 мг/5 мл може викликати плутанину при призначенні та дозуванні; це слід уникати.</i>
Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)	Рідина для орального застосування: 50 мг/мл. <i>[-] Рідина для орального застосування: 200мг/5 мл. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії: 300 мг; 500 мг (натрію вальпроат) Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 300 мг. [-] Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 200 мг, 500мг [-] Таблетки (подрібнювані): 100мг.</i>
Додатковий перелік	
<i>[-] Етосуксимід (Ethosuximide)</i>	<i>[-] Капсули: 250 мг. [-] Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл.</i>
6. ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
6.1 Антигельмінтні лікарські засоби	
6.1.1 Кишкові антигельмінтні лікарські засоби	
Альбендазол (Albendazole)	Таблетки (жувальні): 400 мг.
Левамізол (Levamisole)	Таблетки: 50 мг; 150 мг (у вигляді гідрохлориду).

Мебендазол (Mebendazole)	Таблетки: 100 мг. [-] Таблетки (жувальні): 500 мг
[-] Ніклозамід (Niclosamide)	[-] Таблетки (жувальні): 500 мг
Празиквантел (Praziquantel)	Таблетки: 600 мг. [-] Таблетки: 150 мг
Пірантел (Pyrantel)	Розчин для перорального застосування: 50мг (у вигляді ембонату або памоату)/мл., 125 мг/2,5 мл, 250мг/5мл Таблетки: 250 мг (у вигляді ембонату або памоату).
6.1.2 Антифілярійні лікарські засоби	
Альбендазол (Albendazole)	Таблетки (жувальні): 400 МГ.
[-] Диетилкарбамазепін (Diethylcarbamazine)	[-] Таблетки: 50 мг; 100 мг (дигідрогену цитрат)
[-] Івермектин (Ivermectin)	[-] Таблетки (ділімі): 3 мг
6.1.3 Антишистосомічні та інші антитрематодні лікарські засоби	
Празиквантел (Praziquantel)	Таблетки: 600 мг.
[-] Триклабендазол (Triclabendazole)	[-] Таблетки: 250 мг
Додатковий перелік	
[-] Оксамніхін (Oxamniquine)*	[-] Капсули: 250 мг [-] Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл *Оксамніхін слід використовувати, якщо лікування празиквантелом не допомагає.
6.2 Антибактеріальні лікарські засоби	
6.2.1 Бета-лактаміні лікарські засоби	
Амоксицилін (Amoxicillin)	Порошок для приготування розчину для перорального застосування (у вигляді тригідрату): 125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл [д]. Таблетки: 250 мг; 500 мг (у вигляді тригідрату).
Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	Розчин для перорального застосування: 125 мг амоксициліну + 31.25 мг клавуланової кислоти/5 мл; 250 мг амоксициліну + 62.5 мг клавуланової кислоти/5 мл [д]. Таблетки: 500 мг амоксициліну (у вигляді тригідрату) + 125 мг клавуланової кислоти (у вигляді калієвої солі).
Ампіцилін (Ampicillin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг; 1 г (у вигляді калієвої солі).
Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1.44 г бензилпеніциліну (= 2.4 млн. МО) у 5-мл флаконі. [-] Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 900 мг бензилпеніциліну (= 1.2 млн. МО) у 5-мл флаконі [д].
Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 600 мг (= 1 млн. МО) (натрієвої або калієвої солі); [-] Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 3 г (= 5 млн. МО) (натрієвої або калієвої солі)
Цефалексин (Cefalexin) [д].	Порошок/гранули для оральної суспензії: 250 мг/5мл (безводний); 125 мг/5 мл Капсули: 250 мг (у вигляді моногідрату).
Цефазолін (Cefazolin) *☑	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі. *Для хірургічної профілактики. ☑ > 1 місяця.

Цефіксим (Cefixime)*	Капсули: 400 мг (у вигляді тригідрату). * Тільки для лікування однією дозою неускладненої аногенітальної гонореї
Цефтриаксон (Ceftriaxone) *☑	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі. *Не призначати з кальцієм і уникати у новонароджених з гіпербілірубінемією. ☑ > 41 тижнів гестаційного віку.
<i>[-] Клоксацилін (Cloxacillin)</i>	<i>[-] Капсули: 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі) [-] Порошок для приготування розчину для ін'єкцій 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі [-] Порошок для приготування розчину для перорального застосування 125 мг (у вигляді натрієвої солі)/5 мл</i>
<i>[-] Феноксиметилпеніцилін (Phenoxymethylpenicillin)</i>	<i>[-] Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 250 мг (у вигляді калієвої солі)/5 мл [-] Таблетки: 250 мг (у вигляді калієвої солі)</i>
<i>[-] Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin)*</i>	<i>[-] Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (=1 млн. МО); 3 г (=3 млн. МО) у флаконі * Прокаїну бензилпеніцилін не рекомендований у якості першої лінії лікування неонатального сепсису, окрім умов з високою смертністю новонароджених, під професійним наглядом, у випадках, коли лікування у госпіталі не можливе.</i>
Додатковий перелік	
Цефотаксим (Cefotaxime) * <i>[сп]</i> .	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг у флаконі (у вигляді натрієвої солі). * цефалоспорины 3-го покоління є препаратами вибору для використання у госпіталізованих новонароджених.
Цефтазидим (Ceftazidime)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг; 1 г (у вигляді пентагідрату) у флаконі.
Імipенем + Циластатин (Imipenem + Cilastatin)*	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг (у вигляді моногідрату) + 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.
	<i>[-] Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг (у вигляді моногідрату) + 250 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі. * Призначається лише для лікування лікарняних інфекцій, що загрожують життю, через підозрювану або доведену інфекцію, резистентну до комбінованої терапії. Меропенем показаний для лікування менінгіту та дозволений для використання у дітей у віці старше 3 місяців.</i>
6.2.2 Інші антибактеріальні лікарські засоби	
Азитроміцин (Azithromycin)*	Капсули: 250 мг; 500 мг (безводний). Оральний розчин: 200 мг/5 мл. *Тільки для лікування одноразовою дозою статевого хламідіозу і трахоми.
Хлорамфенікол (Chloramphenicol)*	Таблетки: 250 мг Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (натрію сукцинат) у флаконі. <i>[-] Олійна суспензія для ін'єкцій*: 0.5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл у 2-мл амп. *Лише для пробного лікування епідемічного менінгіту у дітей старше 2 років [-] Розчин для перорального застосування: 150 мг (у вигляді пальмітату)/5 мл.</i>
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)*	Розчин для в/в інфузій: 2 мг/мл (у вигляді гіклату) [д]

дорослих	*для	Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду). [-] Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл (безводний) [d]
Кларитроміцин (Clarithromycin)*		Таблетки: 500 мг. *Для комбінованої терапії з метою ерадикації H. Pylori у дорослих
Доксициклін (Doxycycline) ☒		Тверді оральні форми: 100 мг (у вигляді гіклату). [-] Розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [d] [-] Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл (безводний) [d]. [-] Тверді оральні форми: 50 мг [d] ☒ - використання у дітей віком <8 років допустиме лише для лікування інфекцій, що загрожують життю, за відсутності альтернатив.
Еритроміцин (Erythromycin)		Таблетки: 250 мг. [-] Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг (у вигляді лактобіонату) у флаконі [-] Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 125 мг/5 мл (у вигляді стеарату або естолату або етилу сукцинату)
Гентаміцин (Gentamicin)		Розчин для ін'єкцій: 40 мг (у вигляді сульфату)/мл у 2 мл ампулах. [-] Розчин для ін'єкцій: 10 мг
Метронідазол (Metronidazole)		Розчин для інфузій: 500 мг у 100 мл флаконах. Супозиторії: 500 мг. Таблетки: 200 мг - 500 мг. [-] Розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату)/5 мл. [-] Супозиторії: 1 г
Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)		Таблетки: 100 мг. [-] Розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [d].
Спектиноміцин (Spectinomycin)		Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 2 г (у вигляді гідрохлориду) у флаконі.
Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)		Розчин для ін'єкцій: 80 мг + 16 мг/мл у 5 мл в ампулах. Розчин для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл Таблетки: 100 мг + 20мг; 400 мг + 80 мг. [-] Таблетки: 800мг+160 мг. [-] Розчин для ін'єкцій: 80 мг + 16 мг/мл у 10 мл в ампулах.
[-] Триметоприм (Trimethoprim) ☒		[-] Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [d]. [-] Таблетки: 100 мг; 200 мг ☒ >6 місяців
Додатковий перелік		
Кліндаміцин (Clindamycin)		Капсули: 150 мг (у вигляді гідрохлориду); Розчин для ін'єкцій: 150 мг (у вигляді фосфату)/мл. [-] Розчин для перорального застосування: 75 мг/5 мл (пальмітат) [d].
Ванкоміцин (Vancomycin)		Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг (гідрохлорид) у флаконі.
6.2.3 Антилепрозійні лікарські засоби		
Лікарські засоби для лікування прокази повинні завжди використовуватися у комбінації. Комбінована терапія є необхідною для запобігання виникненню резистентності до лікарських засобів. Забарвлені упаковки, що містять комбінації 2 лікарських засобів (малобацилярна проказа) або 3 лікарських засобів (мультибацилярна проказа) слід використовувати для		

лікування прокази у дорослих та дітей.	
Клофазимін (Clofazimine)	Капсули: 50 мг; 100 мг.
<i>[-] Дапсон (Dapsone)</i>	<i>[-] Таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг</i>
Рифампіцин (Rifampicin)	Капсули: 150 мг; 300 мг.
6.2.4 Протитуберкульозні лікарські засоби	
ВООЗ рекомендує та погоджує використання фіксованих комбінацій, а також розробку нових належних фіксованих комбінацій, включаючи форми випуску з модифікованим вивільненням, незаморожених продуктів та педіатричних форм достовірної фармацевтичної якості.	
Етамбутол (Ethambutol)	Таблетки: 400 мг (гідрохлорид). <i>[-] Розчин для перорального застосування: 25 мг/мл [d].</i> <i>[-] Таблетки: 100 мг</i>
<i>[-] Етамбутол + Ізоніазид (Ethambutol + Isoniazid)</i>	<i>[-] Таблетки: 400 мг + 150 мг</i>
Етамбутол + Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	Таблетки: 275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг.
Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin)	Таблетки: 275 мг + 75 мг+ 150 мг.
Ізоніазид (Isoniazid)	Таблетки: 100 мг - 300 мг. <i>[-] Розчин оральний: 50 мг/5 ml [d], 100 мг/5 мл</i> <i>[-] Таблетки (ділімі): 50 мг.</i>
<i>[-] Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)</i>	<i>[-] Таблетки: 75 мг + 400 мг + 150 мг; 150 мг + 500 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень)</i>
Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)	Таблетки: 75 мг+ 150 мг. <i>[-] Таблетки: 150 мг + 300 мг; 60 мг + 60 мг /150 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень)</i>
Піразинамід (Pyrazinamide)	Таблетки: 500 мг. <i>[-] Розчин для перорального застосування: 30 мг/мл [d].</i> <i>[-] Таблетки: 400 мг</i> <i>[-] Таблетки (дисперсивні): 150 мг</i> <i>[-] Таблетки (ділімі): 150 мг</i>
Рифабутин (Rifabutin)*	Капсули: 150 мг. *Для використання тільки у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, які отримують інгібітори протеази
Рифампіцин (Rifampicin)	Капсули: 150 мг; 300 мг. <i>[-] Розчин для перорального застосування: 20 мг/мл [d].</i>
Стрептоміцин (Streptomycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) у фл.
Додатковий перелік	
Лікарські засоби другої лінії для лікування мультирезистентного туберкульозу слід використовувати у спеціалізованих протитуберкульозних закладах охорони здоров'я, дотримуючись стандартів ВООЗ щодо контролю туберкульозу	
Амікацин (Amikacin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг; 1 г (у вигляді сульфату). <i>[-] Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 100 мг</i>
Капреоміцин (Capreomycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату).
Циклосерин (Cycloserine)	Тверда оральна форма: 250мг
Етіонамід (Ethionamide)*	Таблетки: 250 мг. *Протіонамід може бути альтернативою. <i>[-] Таблетки: 125 мг</i>
Канаміцин (Kanamycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) розчин).

Левовфлоксацин (Levofloxacin)*	Таблетки: 250 мг; 500 мг; 750 мг. * Офлоксацин і моксифлоксацин можуть бути альтернативою при наявності в програмах лікування.
Натрію аміносаліцилат (Sodium aminosalicylate)	Гранули: 4 г у пакетику. Таблетки: 500 мг
Стрептоміцин (Streptomycin) [сп]	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) у фл.
6.3 Протигрибкові лікарські засоби	
Амфотерицин В (Amphotericin B)	Порошок для приготування розчину для інфузій: 50 мг у флаконі (у вигляді натрію деоксихолату або комплексу з ліпосомами).
Клотримазол (Clotrimazole)	Вагінальний крем: 10%. Вагінальні таблетки: 100 мг; 500 мг [-] Вагінальний крем: 1%
Флуконазол (Fluconazole)	Капсули: 50 мг Розчин для інфузій: 2 мг/мл у флаконі. [-] Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл
Флуцитозин (Flucytosine)	Розчин для інфузій: 2,5 г в 250 мл. [-] Капсули: 250 мг
Гризеофульвін (Griseofulvin)	Таблетки: 125 мг [-] Розчин для перорального застосування: 125 мг/5 мл [д] Таблетки: 250 мг
Ністатин (Nystatin)	Таблетки: 500 000 МО [-] Пастилки: 100 000 МО [-] Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д]; 100 000 МО/мл [д]. [-] Пессарій: 100 000 МО [-] Таблетки: 100 000 МО
Додатковий перелік	
Калію йодид (Potassium iodide)	[-] Насичений розчин
6.4. Протівірусні лікарські засоби	
6.4.1 Протигерпесні лікарські засоби	
Ацикловір (Aciclovir)	Порошок для приготування розчину для інфузій: 250 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі. Таблетки: 200 мг [-] Оральний розчин: 250 мг/5 мл [д]
6.4.2. Антиретровірусні лікарські засоби	
На основі сучасних доказів та досвіду використання, антиретровірусні лікарські засоби наступних трьох класів включені до переліку основних лікарських засобів для лікування та профілактики ВІЛ (профілактика перенесення від матері до дитини, а також профілактика після контакту). ВООЗ підкреслює важливість використання цієї групи лікарських засобів у відповідності до глобальних та національних настанов медичної допомоги. ВООЗ схвалює та рекомендує використовувати фіксовані комбінації, розробляти нові комбінації з фіксованими дозами, включаючи модифіковані лікарські форми, лікарські форми, що не потребують охолодження, та педіатричні лікарські форми належної якості. Ділімі таблетки можуть використовуватися у дітей, тому вони можуть бути включені до номенклатури, за умови наявності препаратів відповідної якості.	
6.4.2.1 Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази	
Абакавір (Abacavir)	Розчин для перорального застосування: 100 мг (у вигляді сульфату)/5 мл. Таблетки: 300 мг (у вигляді сульфату).
[-] Диданозин (Didanosine)	[-] Таблетки (буферизовані жувальні, дисперсивні): 25 мг; 50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг [-] Буферизований порошок для приготування розчину для перорального застосування: 100 мг; 167 мг; 250 мг у пакетах [-] Капсули (небуферизовані, вкриті кишковорозчинною оболонкою): 125 мг; 200 мг; 250 мг; 400 мг.

<i>[-] Емтрицитабін (Emtricitabine) * ☒</i>	<i>[-] Розчин оральний: 10 мг/мл. [-] Капсули: 200 мг * FTC є прийнятною альтернативою ЗТС, на основі знань фармакології, моделей резистентності та клінічних досліджень антиретровірусних лікарських засобів. ☒ >3 місяців.</i>
Ламівудин (Lamivudine)	Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл Таблетки: 150 мг
Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate)	Таблетки (тенфовіру дизопроксилу фумарат - еквівалентний 245 мг тенофовіру дизопроксилу): 300 мг.
Зидовудин (Zidovudine)	Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл. Розчин для приготування в/в інфузій: 10 мг/мл у 20 мл. Таблетки: 300 мг Капсули: 100 мг
Ставудин (Stavudine (d4T))	Капсули: 30 мг. <i>[-] Капсули: 15 мг; 20 мг [-] Порошок для приготування орального розчину: 5 мг/5 мл</i>
6.4.2.2 Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази	
Ефавіренз (Efavirenz) ☒	Капсули: 50 мг; 200 мг. Таблетки: 600 мг. <i>[-] Капсули: 100 мг [-] Розчин для перорального застосування: 150 мг/5 мл ☒ >3 років або >10 кг</i>
Невірапін (Nevirapine)	Суспензія для перорального застосування: 50 мг/5 мл Таблетки: 200 мг.
6.4.2.3 Інгібітори протеази	
Вибір інгібіторів протеази з Базового переліку повинен визначатися кожною країною після вивчення міжнародних та національних клінічних настанов та досвіду. Ритонавір рекомендований для використання у комбінації у якості фармакологічного стимулятора, а не окремого антиретровірусного засобу. Решта інгібіторів протеази повинна використовуватися у формі зі стимулятором (наприклад, з ритонавіром).	
<i>[-] Атазанавір (Atazanavir) ☒</i>	<i>[-] Тверда оральна лікарська форма: 100 мг; 150 мг; 300 мг (у вигляді сульфату) ☒ >25 кг</i>
<i>[-] Індінавір (Indinavir)</i>	<i>[-] Капсули: 400 мг (індінавіру сульфату).</i>
Лопінавір+Ритонавір (Lopinavir + Ritonavir)	<i>[-] Капсули: 133,3 мг + 33,3 мг. Таблетки: 100 мг + 25 мг; 200 мг + 50 мг Розчин оральний: 400 мг + 100 мг/5 мл</i>
Ритонавір (Ritonavir)	Тверда оральна лікарська форма: 100 мг <i>[-] Розчин оральний: 400 мг/5 мл [-] Таблетки (термостабільні): 25 мг, 100мг</i>
<i>[-] Саквінавір (Saquinavir) ☒</i>	<i>[-] Тверда оральна лікарська форма: 200 мг; 500 мг (у вигляді мезилату) ☒ >25 кг</i>
Фіксовані комбінації	
Ефавіренц+ Емтрицитабін* +Тенофовір (Efavirenz + Emtricitabine* + Tenofovir)	Таблетки: 600 мг + 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру). *FTC є прийнятною альтернативою ЗТС, заснованою на знанні фармакології, характеру резистентності та клінічних випробувань антиретровірусних препаратів.
Емтрицитабін*+Тенофовір (Emtricitabine* + Tenofovir)	Таблетки: 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру). *FTC є прийнятною альтернативою ЗТС, заснованою на знанні фармакології, характеру резистентності та клінічних випробувань антиретровірусних препаратів.
Ламівудин+Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine)	Таблетки: 30 мг + 60 мг [д]; 150 мг + 300 мг.

<i>[-] Ламівудин+Невірапін+Ставудин (Lamivudine + Nevirapine + Stavudine)</i>	<i>[-] Таблетки: 150 мг + 200 мг + 30 мг. [-] Таблетки (дисперговані): 30 мг + 50 мг + 6 мг [d]; 60 мг + 100 мг + 12 мг [d].</i>
Ламівудин+Невірапін+Зидовудин (Lamivudine + Nevirapine + Zidovudine)	Таблетки: 150 мг + 200 мг + 300 мг <i>[-] Таблетки: 30 мг + 50 мг + 60 мг [d].</i>
6.4.3 Інші протівірусні засоби	
Озельтамівір (Oseltamivir)	Капсули: 30 мг ; 45 мг; 75 мг (фосфату). Порошок для оральної суспензії: 12 мг/мл.
Рибавірин (Ribavirin)*	Розчин для внутрішньовенного введення: 1 г в 10 мл фосфатного буферного розчину. Таблетки/капсули: 200 мг; 400 мг; 600 мг. *Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С. <i>[-] Розчин для внутрішньовенного введення: 800 мг в 10 мл фосфатного буферного розчину.</i>
<i>Додатковий перелік</i>	
Пегільований інтерферон альфа (2a або 2b) (Pegylated interferon alpha (2a or 2b))*	Флакон або шприц: 80 мкг, 100 мкг (Пегінтерферон альфа-2b); 180 мкг (Пегінтерферон альфа-2a) *Для використання в комбінації з рибавірином
6.5 Засоби для лікування протозойних інфекцій	
6.5.1 Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу	
<i>[-] Дилоксанід (Diloxanide) [x]</i>	<i>[-] Таблетки: 500 мг (фураат) [x] >25 кг.</i>
Метронідазол (Metronidazole)	Розчин для інфузій: 500 мг в 100 мл у флаконах Таблетки: 200 мг – 500 мг. <i>[-] Розчин оральний: 200 мг (бензоат)/5 мл</i>
6.5.2 Засоби для лікування лейшманіозу	
Амфотерицин В (Amphotericin B)	Порошок для приготування розчину для інфузій: 50 мг у флаконі (У вигляді натрію деоксихолату або комплексу з ліпосомами).
<i>[-] Мілтефозін (Miltefosine)</i>	<i>[-] Тверда оральна лікарська форма: 10 мг; 50 мг</i>
<i>[-] Пароміцин (Paromomycin)</i>	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 750 мг пароміцину (у вигляді сульфату</i>
<i>[-] Натрію стибоглюконат або Меглюмін антимоіат (Sodium stibogluconate or Meglumine antimoniate)*</i>	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл, 1 флакон = 30 мл або 30%, що еквівалентно приблизно 8.1% сурмі (п'ятивалентній) по 5 мл в ампулах.</i>
6.5.3 Засоби для лікування малярії	
6.5.3.1 Для лікування малярії	
Лікарські засоби для лікування інфекції, спричиненої <i>P. falciparum malaria</i> (тропічної малярії), повинні застосовуватись у комбінаціях. Даний перелік рекомендує комбінації згідно рекомендацій лікування. ВООЗ визнає, що існують не всі з цих FDC та пропонує їх розробку та ретельне дослідження. Комітет також пропонує розробку та тестування ректальних лікарських форм.	
<i>[-] Амодіахін (Amodiaquine)*</i>	<i>[-] Таблетки: 153 мг; 200 мг (гідрохлориду) * Застосовується в комбінації з артезунатом 50 мг.</i>
<i>[-] Артеметер (Artemether)*</i>	<i>[-] Розчин олійний: 80 мг/мл в ампулах по 1 мл. * Для лікування важкої малярії</i>
<i>[-] Артеметер+Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine)*</i>	<i>[-] Таблетки: 20 мг + 120 мг [-] Таблетки (дисперговані): 20 мг + 120 мг [d] * Не рекомендований у першому триместрі вагітності або дітям вагою до 5 кг</i>
<i>[-] Артезунат (Artesunate)*</i>	<i>[-] Ін'єкції: ампули, що містять 60 мг безводної артезунатової кислоти з окремою ампулою 5%</i>

	розчину натрію бікарбонату. Застосовується для лікування тяжкої малярії. [-] Ректальна лікарська форма: 50 мг [d]. [-] Ректальна лікарська форма: 200 мг [d]] Застосовується тільки для попереднього лікування важкої малярії; пацієнти повинні бути направлені до відповідного медичного закладу для подальшого спостереження [c]. [-] Таблетки: 50 мг * - для застосування в комбінації з амодіахіном або меффлохіном або сульфадоксином+піриметаміном
[-] Артезунат+Амодіахіні (Artesunate + Amodiaquine) *	[-] Таблетки: 25 мг + 67.5 мг; 50 мг + 135 мг; 100 мг + 270 мг * Інші комбінації, що забезпечують необхідні цільові дози, такі як 153 мг або 200 мг (у вигляді гідрохлориду) разом з 50 мг артезунату можуть бути альтернативою.
[-] Артезунат +Мефлохіні (Artesunate + Mefloquine)	[-] Таблетки: 25 mg + 55 mg; 100 mg + 220 mg.
[-] Хлорохіні (Chloroquine)*	[-] Розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл. [-] Таблетки: 100 мг; 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату) * Використовувати тільки для лікування інфекції, спричиненої P.vivax.
Доксициклін (Doxycycline)*	Капсули: 100 мг (гідрохлориду або хіклату). Таблетки (дисперговані): 100 мг (у вигляді моногідрату) *Для використання тільки в поєднанні з хініном
Мефлохіні (Mefloquine)*	Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду). *Для використання у комбінації з артезунатом 50 мг.
[-] Прімахіні (Primaquine)*	[-] Таблетки: 7.5 мг; 15 мг (у вигляді дифосфату) * Використовувати протягом 14 днів лише для досягнення радикального лікування інфекції, спричиненої P.vivax та P.ovale.
[-] Хініні (Quinine)*	[-] Ін'єкції: 300 мг хініну гідрохлориду/мл в ампулах по 2 мл. [-] Таблетки: 300 мг хініну сульфату або бісульфату * Використовувати тільки для лікування тяжкої малярії, а також необхідно використовувати в комбінації з доксицикліном.
[-] Сульфадоксин+Піриметаміні (Sulfadoxine + Pyrimethamine)*	[-] Таблетки: 500 мг + 25 мг * Застосовувати тільки в комбінації з артезунатом 50 мг.
6.5.3.2 Для профілактики малярії	
[-] Хлорохіні (Chloroquine)*	[-] Розчин пероральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл. [-] Таблетки: 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату). * Для використання тільки у регіонах Центральної Америки, застосовувати при інфекції, спричиненої P.vivax.
Доксициклін (Doxycycline) ☒	Тверда пероральна лікарська форма: 100 мг (у вигляді гідрохлориду або хіклату). ☒ >8 років.
Мефлохіні (Mefloquine) ☒	Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду). ☒ > 5 кг або> 3 місяців
[-] Прогуанілі (Proguanil)*	[-] Таблетки: 100 мг (у вигляді гідрохлориду) * Для використання тільки у комбінації з хлорохіном.

6.5.4 Засоби для лікування пневмоцистозу та токсоплазмозу	
[-] Пириметамін (Pyrimethamine)	[-] Таблетки: 25 мг
[-] Сульфадіазин (Sulfadiazine)	[-] Таблетки: 500 мг
Сульфаметоксазол+ Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	Розчин для ін'єкцій: 80 мг + 16 мг/мл у 5- мл ампулах. Розчин для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл [д] Таблетки: 100 мг + 20мг; 400 мг + 80 мг [д] [-] Ін'єкції: 80 мг + 16 мг/мл в ампулах по 10 мл
Додатковий перелік	
[-] Пентамідин (Pentamidine)	[-] Таблетки: 200 мг; 300 мг (у вигляді ізетіонату)
6.5.5. Лікарські засоби для лікування трипаносомозу	
6.5.5.1. Лікарські засоби для лікування африканського трипаносомозу	
Лікарські засоби для лікування першої стадії африканського трипаносомозу	
[-] Пентамідин (Pentamidine)*	[-] Порошок для ін'єкцій: 200 мг (у вигляді ізетіонату) у флаконах. * Використовується для лікування інфекції, спричиненої <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .
[-] Сурамін натрію (Suramin sodium)*	[-] Порошок для ін'єкцій: 1 г у флаконах. * Використовується для лікування початкової фази інфекції, спричиненої <i>Trypanosoma brucei rhodesiense</i> .
Лікарські засоби для лікування другої стадії африканського трипаносомозу	
[-] Ефлорнітин (Eflornithine)*	[-] Ін'єкції: 200 мг (гідрохлорид)/мл по 100 мл у пляшках * Використовується для лікування інфекції, спричиненої <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .
[-] Меларсопрол (Melarsoprol)	[-] Ін'єкції: 3.6% розчин по 5мл в ампулах (180 мг активного компоненту).
[-] Нифуртимокс (Nifurtimox)*	[-] Таблетки: 120 мг * Тільки для використання в комбінації з ефлорнітином для лікування інфекції, спричиненої <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .
Додатковий перелік [сп]	
[-] Меларсопрол (Melarsoprol)	[-] Ін'єкції: 3.6% розчин по 5мл в ампулах (180 мг активного компоненту).
6.5.5.2. Лікарські засоби для лікування американського трипаносомозу	
[-] Бензнідазол (Benznidazole)	[-] Таблетки: 100 мг; 12,5 мг [д] [-] Таблетки (ділімі): 50 мг
[-] Нифуртимокс (Nifurtimox)	[-] Таблетки: 30 мг; 120 мг; 250 мг
7. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ	
7.1. Для лікування гострого нападу мігрені	
Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	Таблетки: 300 мг - 500 мг.
Ібупрофен (Ibuprofen) [д]	Таблетки: 200 мг; 400 мг
Парацетамол (Paracetamol)	Розчин оральний: 125 мг/5 мл [д] Таблетки: 300 мг - 500 мг.
7.2 Для профілактики мігрені	
Пропранолол (Propranolol)	[-] Таблетки: 20 мг (гідрохлорид). Таблетки: 40 мг (гідрохлорид).
8. Антинеопластичні та імуносупресивні лікарські засоби	
8.1 Імуносупресивні лікарські засоби (Immunosuppressive medicines)	
Додатковий перелік	
[-] Азатіоприн (Azathioprine)	[-] Порошок для ін'єкцій: 100 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконах [-] Таблетки: 50 мг.
Циклоспорин (Ciclosporin)	Капсули: 25 мг. Концентрат для розчину для ін'єкцій: 50 мг/мл по 1 мл в ампулах.

8.2 Цитотоксичні та ад'ювантні лікарські засоби	
<i>Додатковий перелік</i>	
Алопуринол (Allopurinol) [сп]	Таблетки: 100 мг; 300 мг.
Аспарагіназа (Asparaginase)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 10 000 МО у флаконах.
Блеоміцин (Bleomycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 15 мг (у вигляді сульфату) у флаконах.
Кальцію фолінат (Calcium folinate)	Розчин для ін'єкцій: 3 мг/мл по 10 мл в ампулах [-] Таблетки: 15 мг.
Карбоплатин (Carboplatin)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг/5 мл; 150 мг/15 мл; 450 мг/45 мл; 600 мг/60 мл.
Хлорамбуцил (Chlorambucil)	Таблетки: 2 мг.
Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	Порошок для розчину для ін'єкцій: 500 мг у флаконах. [-] Таблетки: 25 мг
Цитарабін (Cytarabine)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл
Дакарбазин (Dacarbazine)	Порошок для ін'єкцій: 100 мг/фл
[-] Дактиномицин (Dactinomycin)	[-] Порошок для ін'єкцій: 500 мкг у фл.
[-] Даунорубіцин (Daunorubicin)	[-] Порошок для ін'єкцій: 50 мг (гідрохлорид) у флаконах
Доцетаксел (Docetaxel)	Розчин для інфузій: 20 мг/мл; 40 мг/мл.
Доксорубіцин (Doxorubicin)	Порошок для інфузій: 10 мг/фл.; 50 мг/фл.
Етопозид (Etoposide)	[-] Капсули: 100 мг Розчин для ін'єкцій: 20 мг/мл в 5 мл ампулах
Фторурацил (Fluorouracil)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл по 5 мл (250 мг)
[-] Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)	[-] Тверда оральна лікарська форма: 200 мг; 250 мг; 300 мг; 400 мг; 500 мг; 1 г
Іфосфамід (Ifosfamide)	Порошок для ін'єкцій: 1 г; 2 г у фл.
[-] Меркаптопурин (Mercaptopurine)	[-] Таблетки: 50 мг
Месна (Mesna)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл по 4 мл в амп. [-] Таблетки: 400 мг; 600 мг
Метотрексат (Methotrexate)	Розчин для ін'єкцій: по 5 мл (50 мг) у фл. Таблетки: 2,5 мг/табл.
Паклітаксел (Paclitaxel)	Концентрат для розчину для інфузій: 6 мг/мл.
[-] Прокарбазин (Procarbazine)	[-] Капсули: 50 мг (у вигляді гідрохлориду).
Тіогуанін (Tioguanine) [сп]	Тверда оральна форма: 40 мг.
Вінбластин (Vinblastine)	Порошок для ін'єкцій: 5 мг (сульфат) у флаконах. [-] Порошок для ін'єкцій: 10 мг (сульфат) у флаконах.
Вінкристин (Vincristine)	Порошок для ін'єкцій: 1 мг (сульфат) у фл. [-] Порошок для ін'єкцій: 5 мг (сульфат) у фл.
8.3 Гормони та антигормони	
<i>Додатковий перелік</i>	
Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі натрію фосфату). [-] Розчин оральний: 2мг/5 мл [сп].
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконах.
Метилпреднізолон (Methylprednisolone) [сп]	Порошок для ін'єкцій: 40 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у флаконах [-] Порошок для ін'єкцій: 40 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 5 мл багато доз у флаконах [-] Порошок для ін'єкцій: 80 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у флаконах
Преднізолон (Prednisolone)	Таблетки: 5 мг. [-] Розчин оральний: 5 мг/мл [сп] [-] Таблетки: 25 мг
Тамоксифен (Tamoxifen)	Таблетки: 10 мг (у вигляді цитрату); 20 мг (у вигляді цитрату).

9.ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
Біперидин (Biperiden)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг (лактат) по 1 мл в ампулах Таблетки: 2 мг (гідрохлорид)
Леводопа+ Карбідopa (Levodopa + Carbidopa)	Таблетки: 250 мг + 25 мг; [-] Таблетки: 100 мг + 10 мг
10. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КРОВ	
10.1 Антианемічні лікарські засоби	
Заліза сіль (Ferrous salt)	[-] Розчин оральний: еквівалентно 25 мг заліза (у вигляді сульфату)/мл. [-] Таблетки: еквівалентно 60 мг заліза. Капсули: 350 мг, що еквівалентно 115 мг елементарного заліза та таблетки 80 мг
Заліза сіль+Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)	[-] Таблетки: еквівалентно 60 мг заліза + 400 мкг фолієвої кислоти. Таблетки: заліза (II) сульфат сесквігідрат 256,3 мг (що еквівалентно 80 мг заліза) + К-та фолієва 0,35 мг АБО 357 мг заліза (III) гідроксиду полімальтозат, що еквівалентно 100 мг заліза, фолієвої кислоти 0,35 мг Капсули: заліза (III) гідроксиду полімальтозний комплекс (у перерахунку на елементарне залізо) 100 мг; кислота фолієва 550 мкг
Фолієва кислота (Folic acid)	Таблетки: 1 мг; 5 мг.
Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг (у вигляді ацетату, гідрохлориду або сульфату) по 1 мл в ампулах
10.2 Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію та гемостатичні засоби	
Гепарин натрій (Heparin sodium)	Розчин для ін'єкцій: 5000 МО/мл по 1 мл в ампулах [-] Розчин для ін'єкцій: 1000 МО/мл по 1 мл в ампулах; 20000 МО/мл по 1 мл в ампулах
Фітоменадіон (Phytomenadione)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл по 1 мл в ампулах [-] Розчин для ін'єкцій: 1 мг/мл [d] [-] Таблетки: 10 мг
Протаміну сульфат (Protamine sulfate)	[-] Ін'єкції: 10 мг/мл в 5 мл ампулах Розчин для ін'єкцій: 1000 МО/мл по 10 мл у флаконах
Транексамова кислота (Tranexamic acid)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл по 5 мл в ампулах та по 10 мл у флаконах
Варфарин (Warfarin)	Таблетки: 5 мг (натрієва сіль). [-] Таблетки: 1 мг, 2 мг (натрієва сіль).
Додатковий перелік [сп]	
Гепарин натрій (Heparin sodium)	Розчин для ін'єкцій: 5000 МО/мл по 1 мл в ампулах [-] Розчин для ін'єкцій: 1000 МО/мл по 1 мл в ампулах
Протаміну сульфат (Protamine sulfate)	[-] Ін'єкції: 10 мг/мл в 5 мл ампулах Розчин для ін'єкцій: 1000 МО/мл по 10 мл у флаконах
Варфарин (Warfarin)	Таблетки: 5 мг (натрієва сіль). [-] Таблетки: 0,5 мг, 1 мг, 2 мг (натрієва сіль).
10.3 Інші лікарські засоби, що застосовуються при гемоглобінопатіях	
Додатковий перелік	
[-] Дефероксамін (Deferoxamine)	[-] Порошок для ін'єкцій: 500 мг у флаконах. *Деферазірокс, пероральна форма, може бути альтернативою, залежно від вартості та доступності.
Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)	Тверда оральна лікарська форма: 500 мг. [-] Тверда оральна лікарська форма: 200 мг; 1 г
11. ПРЕПАРАТИ КРОВІ ТА ПЛАЗМОЗАМІННІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЛЮДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ (на етапі розробки експертами ВООЗ)	

12. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ	
12.1 Антиангінальні лікарські засоби	
Бісопролол (Bisoprolol)	Таблетки: 5 мг. [-] Таблетки: 1,25 мг * в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	Таблетки: (сублінгвальні) 500 мкг.
Ізосорбїду динітрат (Isosorbide dinitrate)	Таблетки: (сублінгвальні) 5 мг.
Верапаміл (Verapamil)	Таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид).
12.2 Антиаритмічні лікарські засоби	
Бісопролол (Bisoprolol)	Таблетки: 5 мг [-] Таблетки: 1,25 мг * в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи
Дигоксин (Digoxin)	Розчин для ін'єкцій: 250 мкг/мл по 1 мл в ампулах Таблетки: 0,25 мг [-] Розчин оральний: 50 мкг/мл [-] Таблетки: 62,5 мкг
Епінефрин (Epinephrine)	Розчин для ін'єкцій: 1,8 мг/мл по 1 мл в ампулах. [-] Розчин для ін'єкцій: 100 мкг/мл (у вигляді тартрату або гідрохлориду) по 10 мл в ампулах
Лідокаїн (Lidocaine)	Розчин для ін'єкцій: 20 мг (гідрохлорид)/мл по 5 мл в ампулах, 100 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах
Верапаміл (Verapamil)	Таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид). Розчин для ін'єкцій: 2,5 мг/мл.
Додатковий перелік	
Аміодарон (Amiodarone)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл по 3 мл в ампулах (гідрохлорид) Таблетки: 200 мг (гідрохлорид) [-] Таблетки: 100 мг, 400 мг (гідрохлорид).
12.3 Антигіпертензивні лікарські засоби	
Амлодипін (Amlodipine)	Таблетки: 5 мг (у вигляді малеату або бесилату).
Бісопролол (Bisoprolol)*	Таблетки: 5 мг * в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи [-] Таблетки: 1,25 мг
Еналаприл (Enalapril)	Таблетки: 2.5 мг; 5 мг
[-] Гідралазин (Hydralazine)*	[-] Порошок для ін'єкцій: 20 мг (гідрохлорид) в ампулах [-] Таблетки: 25 мг; 50 мг (гідрохлорид) * Гідралазин дозволений тільки для лікування тяжкої гіпертензії, індукованої вагітністю. Не рекомендується його застосування при есенціальній гіпертензії у зв'язку з наявністю суттєвіших доказів ефективності та безпеки інших лікарських засобів.
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	Таблетки: 25 мг. [-] Таблетки: 12.5 мг [-] Розчин оральний: 50 мг/5 мл.
Метилдопа (Methyldopa)	Таблетки: 250 мг. *Метилдопа призначена тільки для використання при гіпертензії, викликаній вагітністю. Його використання в лікуванні гіпертонічної хвороби не рекомендується у зв'язку з наявністю більшої кількості даних про ефективність і безпеку інших лікарських засобів.
Додатковий перелік	
[-] Нітропрусид натрію (Sodium nitroprusside)	[-] Порошок для ін'єкцій: 50 мг в ампулах, флаконах

12.4 Лікарські засоби, що застосовуються при серцевій недостатності	
Бісопролол (Bisoprolol)*	Таблетки: 5 мг * в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи [-] Таблетки: 1,25 мг
Дигоксин (Digoxin)	Розчин для ін'єкцій: 250 мкг/мл по 1 мл в ампулах. Таблетки: 0,25 мг [-] Розчин для ін'єкцій: 250 мкг/мл по 2 мл в ампулах. [-] Розчин оральний: 50 мкг/мл. [-] Таблетки: 62,5 мкг
Еналаприл (Enalapril)	Таблетки: 2,5 мг; 5 мг
Фуросемід (Furosemide)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах. Таблетки: 40 мг. [-] Розчин оральний: 20 мг/5 мл [0]
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	Таблетки: 25 мг [-] Розчин оральний: 50 мг/5 мл
Спіронолактон (Spironolactone)	Таблетки: 25 мг.
Додатковий перелік	
Допамін (Dopamin)	Концентрат для приготування розчину для інфузій: 40 мг/мл по 5 мл в ампулах
12.5 Антитромботичні лікарські засоби	
Ацетисаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)	Таблетки: 100 мг
Додатковий перелік	
Стрептокіназа (Streptokinase)	Порошок для ін'єкцій: 1,5 млн МО у флаконах.
12.6 Гіполіпідемічні лікарські засоби	
Симвастатин (Simvastatin)*	Таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг * Для застосування у пацієнтів з високим ризиком розвитку тромбозів [-] Таблетки: 5 мг
13. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДЕРМАТОЛОГІЇ (МІСЦЕВІ)	
13.1 Протигрибкові лікарські засоби	
Міконазол (Miconazole)	Крем: (нітрат) 2%.
[-] Selenium sulfide (Selenium sulfide)	[-] Суспензія на основі детергентів: 2%
Тіосульфат натрію (Sodium thiosulfate)	[-] Розчин: 15%.
Тербінафін (Terbinafine)	Крем або мазь: 1% тербінафіну гідрохлорид. [-] Мазь: 1% тербінафіну гідрохлорид
13.2 Протимікробні лікарські засоби	
Мупіроцин (Mupirocin)	Крем: (у вигляді мупіроцину кальцію): 2%. Мазь: 2%.
Калію перманганат (Potassium permanganate)	Водний розчин: 1:10 000.
Срібла сульфадіазин (Silver sulfadiazine) ☑	Крем: 1%. ☑ > 2 місяці
13.3 Протизапальні засоби та засоби проти свербіжу	
Бетаметазон (Betamethasone) ☑	Крем: 0,1% (у вигляді валерату) Мазь: 0,1% (у вигляді валерату) ☑ У новонароджених краще застосовувати гідрокортизон.
[-] Каламін (Calamine)	[-] Лосьйон
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	Крем або мазь: 1% (ацетат)
13.4 Лікарські засоби, що впливають диференціацію і проліферацію клітин шкіри	
Бензоїлу пероксид (Benzoyl peroxide)	[-] Лосьйон: 5% Лосьйон: 10%. [-] Крем: 5%
[-] Дьоготь (Coal tar)	[-] Розчин: 5%
[-] Фторурацил (Fluorouracil)	[-] Мазь: 5%
[-] Подофілотоксин (Podophyllum resin)	[-] Розчин: 10% до 25%.

Саліцилова кислота (Salicylic acid)	<i>[-]</i> Розчин для зовнішнього застосування: 5 % Розчин для зовнішнього застосування: 1%
<i>[-]</i> Сечовина (Urea)	<i>[-]</i> Крем чи мазь: 5%; 10%
13.5 Засоби для лікування педикульозу та корости	
Бензилбензоат (Benzyl benzoate) ☒	<i>[-]</i> Лосьйон: 25% ☒ >2 років Емульсія: 20%. Крем: 250 мг/г. Мазь: 200 мг/г; 250 мг/г.
Перметрин (Permethrin)	<i>[-]</i> Крем: 5%. <i>[-]</i> Лосьйон: 1%. Мазь: 4% Спрей: 0,5 % Розчин нашкірний: 0,5 %.
14. Діагностичні засоби	
14.1 Офтальмологічні лікарські засоби	
<i>[-]</i> Флюоресцеїн (Fluorescein)	<i>[-]</i> Краплі очні: 1% (натрієва сіль).
Тропікамід (Tropicamide)	Краплі очні: 0,5%
14.2 Рентгенконтрастні засоби	
<i>[-]</i> Амідотризоат (Amidotrizoate)	<i>[-]</i> Розчин для ін'єкцій: 140 мг до 420 мг йоду (у вигляді натрію або меглумінової солі)/мл по 20 мл в ампулах
Барію сульфат (Barium sulfate)	Водна суспензія
Йогексол (Iohexol)	Розчин для ін'єкцій: 140 - 350 мг йоду/мл по 5 мл, 10 мл, 20 мл в амп.
Додатковий перелік	
Барію сульфат (Barium sulfate) <i>[сп]</i>	Водна суспензія
<i>[-]</i> Meglumine iotroxate (Meglumine iotroxate)	<i>[-]</i> Розчин: 5 г до 8 г йоду в 100 мл до 250 мл
15. Дезинфікуючі та антисептичні засоби	
15.1 Антисептичні засоби	
Хлоргексидин (Chlorhexidine)	<i>[-]</i> Розчин: 5% (диглюконат). Розчин: 0,05% (диглюконат).
Етанол (Ethanol)	Розчин: 70% (денатурований)
Повідон-йод (Povidone-iodine)	Розчин для зовнішнього застосування: 10% (що еквівалентно 1% активному йоду).
15.2. Дезинфікуючі засоби	
<i>[-]</i> Порошок з хлором (Chlorine base compound)	<i>[-]</i> Порошок: 0.1% (доступного хлору) для розчину.
<i>[-]</i> Хлороксиленол (Chloroxylonol)	<i>[-]</i> Розчин: 4,80%
<i>[-]</i> Глутарал (Glutaral)	<i>[-]</i> Розчин: 2%
16. ДІУРЕТИКИ	
<i>[-]</i> Амілорид (Amiloride)	<i>[-]</i> Таблетки: 5 мг (гідрохлорид)
Фуросемід (Furosemide)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах. Таблетки: 40 мг. <i>[-]</i> Розчин оральний: 20 мг/5 мл [д] <i>[-]</i> Таблетки: 10 мг; 20 мг [д]
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	Таблетки: 25 мг
Манітол (Mannitol)	<i>[-]</i> Розчин для інфузій: 10%, 20% Розчин для інфузій: 15%
Спіронолактон (Spironolactone)	Таблетки: 25 мг.
Додатковий перелік <i>[сп]</i>	
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	Таблетки (ділімі): 25 мг

Манітол (Mannitol)	<i>[-]</i> Розчин для інфузій: 10%, 20% Розчин для інфузій: 15%
Спіронолактон (Spironolactone)	Таблетки: 25 мг. <i>[-]</i> Розчин оральний: 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл; 25мг/5 мл
17. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ	
<i>Додатковий перелік [сп]</i>	
Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	Дозування, що включають ліпазу, протеазу, амілазу та відповідають віку
17.1 Противиразкові лікарські засоби	
Омепразол (Omeprazole)	Порошок для орального розчину: 20 мг саше. Тверда пероральна лікарська форма: 10 мг; 20 мг; 40 мг. <i>[-]</i> Порошок для орального розчину: 40 мг саше
Ранітидин (Ranitidine)	Розчин для ін'єкцій: 25 мг/мл (гідрохлорид) в 2-мл ампулі. Таблетки: 150 мг (гідрохлорид). <i>[-]</i> Оральна рідина: 75 мг/5 мл (гідрохлорид)
17.2 Протиблювотні лікарські засоби	
Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл в 1-мл ампулі (у вигляді динатрієвої солі фосфату). Тверда пероральна лікарська форма: 0,5 мг; 4 мг. <i>[-]</i> Оральна рідина: 2 мг/5 мл; 0.5 мг/5 мл <i>[-]</i> Тверда оральна лікарська форма: 0.75 мг; 1.5 мг
Метоклопрамід (Metoclopramide) ☒	Розчин для ін'єкцій: 5 мг (гідрохлорид)/мл в 2-мл ампулах. Таблетки: 10 мг (гідрохлорид). <i>[-]</i> Оральна рідина: 5 мг/5 мл <i>[д]</i> ☒ Не для новонароджених.
Ондансетрон (Ondansetron) ☒	Розчин для ін'єкцій: 2 мг основи/мл в 2-мл ампулі (гідрохлорид). Тверда пероральна лікарська форма: еквівалентно 4 мг основи; еквівалентно 8 мг основи. <i>[-]</i> Оральна рідина: 4 мг основи/5 мл <i>[-]</i> Тверда оральна лікарська форма: екв. 24 мг основи ☒ > 1 місяць.
17.3 Протизапальні лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника	
Сульфасалазин (Sulfasalazine)	Таблетки: 500 мг. <i>[-]</i> Утримуюча клізма <i>[-]</i> Супозиторії: 500 мг
<i>Додатковий перелік</i>	
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	<i>[-]</i> Утримуюча клізма. <i>[-]</i> Супозиторії: 25 мг (ацетат)
17.4 Проносні лікарські засоби	
Сена (Senna)	<i>[-]</i> Таблетки: 7,5 мг (сеннозиди), (або традиційні лікарські форми) Таблетки по 70 мг та 13,5 мг
17.5 Лікарські засоби, що застосовуються при діарей	
17.5.1 Оральна регідrataція	

Солі для пероральної регідратації (oral rehydration salts)	Порошок для розведення в 200 мл; 500 мл; 1 л. глюкоза: 75 мг-екв, натрію: 75 мг-екв або ммоль/л, хлорид: 65 мекв або ммоль/л, калій: 20 мг-екв або ммоль / л, цитрат: 10 ммоль / л, осмолярність: 245 мОсм / л, глюкози: 13,5 г / л, хлорид натрію: 2,6 г / л, хлорид калію: 1,5 г / л, дигидрата тринатрійцитрат +: 2,9 г / л. Тринатрійцитрат дигідрат може бути замінений розчином гідрокарбонату натрію (бікарбонату натрію) 2,5 г / л. Однак, стабільність останньої форми випуску дуже погана в умовах тропіків, вона рекомендується лише, якщо виготовляється для негайного використання
17.5.2 Лікарські засоби від діареї у дітей	
<i>[-]</i> Цинку сульфат (Zinc sulfate)*	<i>[-]</i> Тверда оральна лікарська форма: 20 мг *При гострій діареї сульфат цинку повинні використовувати в якості доповнення до солей для пероральної регідратації.
18. ГОРМОНИ, ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА КОНТРАЦЕПТИВИ	
18.1 Кортикостероїди та синтетичні замінники	
Флудрокортизон (Fludrocortisone)	Таблетки: 100 мкг (ацетат).
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	Таблетки: 10 мг; 20 мг <i>[-]</i> Таблетки: 5 мг
18.2 Андрогени	
<i>Додатковий перелік</i>	
Тестостерон (Testosterone)	<i>[-]</i> Розчин для ін'єкцій: 200 мг (енантат) в 1-мл ампулі Зареєстровано: Розчин для ін'єкцій: 250 мг/мл по 4 мл; 250 мг/мл по 1 мл; 1% по 1 мл; 5% по 1 мл.
18.3 Контрацептиви	
18.3.1 Оральні гормональні контрацептиви	
<i>[-]</i> Етинілестрадіол + Левоноргестрел (Етинілестрадіол + Levonorgestrel)	<i>[-]</i> Таблетки: 0,03 мг/0,15 мг
<i>[-]</i> Етинілестрадіол + Норетистерон (Ethinylestradiol +Norethisterone)	<i>[-]</i> Таблетки: 35 мікрограмів + 1 мг
Левоноргестрел (Levonorgestrel)	Таблетки: 1,5 мг; 0,75 мг. <i>[-]</i> Таблетки: 30 мікрограмів
18.3.2 Ін'єкційні гормональні контрацептиви	
<i>[-]</i> Естрадіол ципіонат + Медроксипрогестерон ацетат (Estradiol cypionate + Medroxyprogesterone acetate)	<i>[-]</i> Розчин для ін'єкцій: 5 мг + 25 мг
<i>[-]</i> Норетистерон енантат (Norethisterone enantate)	<i>[-]</i> Масляний розчин: 200 мг/мл в 1-мл ампулі
Медроксипрогестерон (Medroxyprogesterone)	Суспензія для ін'єкцій: у флаконах, у заповнених шприцах 150 мг/мл.
18.3.3 Внутрішньоматкові засоби	
Пристрої, які містять мідь (Copper-containing device)	
18.3.4 Засоби бар'єрної контрацепції	
Презервативи (Condoms)	
Діафрагми (Diaphragms)	
18.3.5 Контрацептивні імплантанти	

<i>[-] Левоноргестрел-Релізінг імплантант (Levonorgestrel-Releasing implant)</i>	<i>[-] Двострижневий імплантант з вивільненням левоноргестрелу: Кожен стрижень містить по 75 мг левоноргестрелу (150 мг загально)</i>
18.4 Естрогени (Estrogens)	
18.5 Інсуліни та інші лікарські засоби, що застосовуються для лікування діабету)	
Гліклазид (Gliclazide)*	Тверда пероральна лікарська форма: (Таблетки з контрольованим вивільненням) 30 мг, 60 мг; 80 мг. * Глібенкламід не підходить пацієнтам старше 60 років.
Глюкагон (Glucagon)	Ін'єкційний розчин: по 1 мг у флаконах 1 мл.
Ін'єкційний інсулін (розчинний) (Insulin injection (soluble))	Розчин для ін'єкцій: 40 ОД/мл; 100 ОД/мл в 10-мл флаконі.
Інсулін середньої тривалості дії (Intermediate-acting insulin)	Суспензія для ін'єкцій: 40 ОД/мл в 10-мл флаконі (з'єднання інсуліну суспензії цинку або ізопан інсуліну).
Метформін (Metformin)	Таблетки: 500 мг (гідрохлорид)
Додатковий перелік [сп]	
Метформін (Metformin)	Таблетки: 500 мг (гідрохлорид)
18.6 Індуктори овуляції	
Додатковий перелік	
Кломіфен (Clomifene)	Таблетки: 50 мг(цитрат).
18.7. Прогестогени	
<i>[-] Медроксипрогестерон ацетат (Medroxyprogesterone acetate)</i>	<i>[-] Таблетки: 5 мг</i>
18.8 Гормони щитовидної залози і антитиреоїдні лікарські засоби	
Левотироксин (Levothyroxine)	Таблетки: 25 мкг [д]; 50 мкг; 100 мкг (натрієва сіль)
Калію йодид (Potassium iodide)	<i>[-] Таблетки: 60 мг</i> Таблетки: 100 мкг; 200 мкг; 1 мг; 250 мг.
<i>[-] Пропілтіоурацил (Propylthiouracil)*</i>	<i>[-] Таблетки: 50 мг</i> <i>* необхідний перегляд використання пропілтіоурацилу у дітей, а також доцільність використання карбамізолу у якості альтернативи</i>
Додатковий перелік [сп]	
<i>[-] Розчин Люголя (Lugol's solution)</i>	<i>[-] Оральний розчин: приблизно 130 мг загального йоду / мл.</i>
Калію йодид (Potassium iodide)	Калію йодид (Potassium iodide) Таблетки: 100 мкг; 200 мкг; 1 мг; 250 мг.
<i>[-] Пропілтіоурацил (Propylthiouracil)</i>	<i>[-] Таблетки: 50 мг</i>
19. ІМУНОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
19.1 Діагностичні засоби	
Всі туберкуліни повинні відповідати вимогам ВООЗ для туберкуліну	
Туберкулін, Туберкулінові проби (Tuberculin)	Розчин для ін'єкцій.
19.2 Сироватки і імуноглобуліни	
Всі фракції плазми крові повинні відповідати вимогам ВООЗ до збору, обробці і контролю якості крові, компонентів крові і похідних плазми	
Анти-D імуноглобулін (людини) (anti-D immunoglobulin (human))	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 250 мкг у флаконі одноразової дози.</i> Розчин для ін'єкцій: 625 МО/мл по 1 мл або 2 мл у ампулах
Протиправцевий імуноглобулін (людини) (Antitetanus immunoglobulin (human))	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 500 МО (1 доза) в ампулах.</i> Розчин для ін'єкцій: 250 МО (1 доза) в ампулах.
Імуноглобулін антирабічний (Rabies immunoglobulin)	<i>[-] Розчин для ін'єкцій: 150 МО/мл в ампулах.</i> Розчин для ін'єкцій: 75 МО в ампулах.

[-] Протиотрутний імуноглобулін (Antivenom immunoglobulin)*	[-] Розчин для ін'єкцій * сила дії та упаковка визначається на місцях.
[-] Антитоксин дифтерії (Diphtheria antitoxin)	[-] Розчин для ін'єкцій: 20 000 ОД в флаконі. [-] Розчин для ін'єкцій: по 10000 МО в ампулах.
19.3 Вакцини Нижченаведений перелік визначає вакцини, для яких існують рекомендації Стратегічної Дорадчої Групи експертів з імунізації ВООЗ звертає увагу на необхідність використання у дітей полівалентних вакцин.	
Вакцина БЦЖ (BCG vaccine)	
[-] Вакцина проти холери (Cholera vaccine)	
Дифтерійний анатоксин (Diphtheria toxoid)	
Вакцина проти гемофільної інфекції типу b (Haemophilus influenzae type b vaccine)	
Вакцина проти гепатиту А (Hepatitis A vaccine)	
Вакцина проти гепатиту В (Hepatitis B vaccine)	
Вакцина проти гриппу (Influenza vaccine)	
[-] Вакцина проти японського енцефаліту (Japanese encephalitis vaccine)	
[-] Вакцина проти кору (Measles vaccine)	
Менінгококова вакцина проти менінгіту (Meningococcal meningitis vaccine)	
[-] Вакцина проти епідемічного паротиту (Mumps vaccine)	
[-] Вакцина проти кашлюку (Pertussis vaccine)	
Пневмококова вакцина (Pneumococcal vaccine)	
Вакцина проти поліомієліту (Polio myelitis vaccine)	
Вакцина проти сказу (Rabies vaccine)	
Вакцина проти краснухи (Rubella vaccine)	
Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	
Вакцина проти черевного тифу (Typhoid vaccine)	
Вакцина проти вітряної віспи (Varicella vaccine)	
Вакцина проти жовтої лихоманки (Yellow fever vaccine)	
Ротавірусна вакцина (Rotavirus vaccine)	
20. МІОРЕЛАКСАНТИ ТА ІНГІБІТОРИ ХОЛІНЕСТЕРАЗИ	
20.1. Міорелаксанти (периферичної дії) та інгібітори холінестерази	
Атракурій (Atracurium)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл (безилат).
Неостигмін (Neostigmine)	Розчин для ін'єкцій: 500 мкг по 1мл ампулах. [-] Розчин для ін'єкцій: 2.5 мг (метилсульфат) в 1-мл ампулі [-] Таблетки: 15 мг (бромід)
Суксаметоній (Suxamethonium)	Розчин для ін'єкцій: 20 мг/мл.

	<i>[-]</i> Розчин для ін'єкцій: 50 мг (хлорид)/мл в 2-мл ампулі <i>[-]</i> Порошок для ін'єкцій: (хлорид), в флаконі
<i>[-]</i> Векуроній (Vecuronium) [д]	<i>[-]</i> Порошок для ін'єкцій: 10 мг (бромід) в флаконі.
Додатковий перелік	
Піридостигмін (Pyridostigmine)	Таблетки: 60 мг (бромід). <i>[-]</i> Розчин для ін'єкцій: 1 мг в 1-мл ампулі
<i>[-]</i> Векуроній (Vecuronium)	<i>[-]</i> Порошок для ін'єкцій: 10 мг (бромід) в флаконі.
21. ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
21.1 Антибактеріальні лікарські засоби	
Ацикловір (Acyclovir)	Мазь: 3%.
<i>[-]</i> Азитроміцин (Azithromycin)	<i>[-]</i> Розчин (очні краплі): 1,5%
<i>[-]</i> Гентаміцин (Gentamicin)	<i>[-]</i> Розчин (очні краплі): 0.3% (сульфат)
Офлоксацин (Ofloxacin)	Розчин (очні краплі): 0.3%
Тетрациклін (Tetracycline)	Очна мазь: 1% (гідрохлорид).
21.2. Протизапальні лікарські засоби	
<i>[-]</i> Преднізолон (Prednisolone)	<i>[-]</i> Розчин (очні краплі): 0.5% (натрію фосфат)
21.3 Місцеві анестетики	
<i>[-]</i> Тетракаїн (Tetracaine) ☒	<i>[-]</i> Розчин (очні краплі): 0.5% (гідрохлорид) ☒ - не застосовувати у недоношених новонароджених
21.4 Міотичні і протиглаукомні лікарські засоби	
Ацетазоламід (Acetazolamide)	Таблетки: 250 мг.
Латанопрост (Latanoprost)	Краплі очні: 50 мкг/мл.
Пілокарпін (Pilocarpine)	<i>[-]</i> Розчин (очні краплі): 2% (гідрохлорид або нітрат); 4% (гідрохлорид або нітрат) Розчин (очні краплі): 10 мг/мл по 5 мл; 10 мг/мл по 10 мл.
Тимолол (Timolol)	Розчин (очні краплі): 0,25; 0,5% (у формі малеату)
21.5 Мідріатичні лікарські засоби	
Атропін (Atropine) * ☒	Розчин (очні краплі): 1% (сульфат) ☒ > 3 місяці * [д] Гоматропін (гідробромід) або Циклопентолат (гідрохлорид). <i>[-]</i> Розчин (очні краплі): 0.1%; 0.5% (сульфат)
Додатковий перелік	
<i>[-]</i> Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	<i>[-]</i> Розчин (очні краплі): 2% (як гідрохлорид)
21.6. Антифактор росту ендотелію судин	
Додатковий перелік	
Бевацизумаб (Bevacizumab)	Ін'єкція: 25 мг/мл.
22. ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ТА ЗНИЖУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МІОМЕТРІЮ	
22.1 Засоби, які підвищують скоротливу активність міометрію	
<i>[-]</i> Ергометрин (Ergometrin)	<i>[-]</i> Розчин для ін'єкцій: 200 мікрограмів (гідромалеат) в 1-мл ампулі
Мізопростол (Misoprostol)	Таблетки: 200 мкг * Для лікування неповного аборту і викидня, а також для профілактики післяпологової кровотечі, де окситоцин недоступний або не може бути безпечно використаний <i>[-]</i> Вагінальні таблетки: 25 мікрограмів* * Тільки для використання при індукції пологів у разі необхідності.
Окситоцин (Oxytocin)	<i>[-]</i> Розчин для ін'єкцій: 10 МО/мл по 1 мл Розчин для ін'єкцій: 5 МО/мл по 1 мл..
Додатковий перелік	
Міфепристон* - Мізопростол*	Таблетки: 200 мг - 200 мкг *Потребує ретельного

	медичного спостереження
22.2 Засоби, які знижують скоротливу активність міометрію (токолітики)	
Ніфедипін (Nifedipine)	<i>[-]</i> Капсули з негайним вивільненням: 10 мг Таблетки: 10 мг
23. РОЗЧИНИ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ	
<i>Додатковий перелік</i>	
Перитонеальний діаліз (відповідного складу) (Intraperitoneal dialysis solution (of appropriate composition))	Парентеральний розчин.
24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПСИХІЧНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ	
24.1 Лікарські засоби, що застосовуються при психотичних розладах	
Хлорпромазин (Chlorpromazine)	Розчин для ін'єкцій: 25 мг (гідрохлорид)/мл в 2-мл ампулі. Таблетки: 100 мг (гідрохлорид). <i>[-]</i> Оральна рідина: 25 мг (гідрохлорид)/5мл
Флуфеназин (Fluphenazine)	Розчин для ін'єкцій: 25 мг (деканоат) в 1 мл ампулах.
Галоперидол (Haloperidol)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг в 1 мл ампулах. Таблетки: 5 мг. <i>[-]</i> Таблетки: 2 мг
Рисперидон (Risperidone)	Тверда оральна лікарська форма: 0,25 мг - 6 мг.
<i>Додатковий перелік</i>	
Хлорпромазин (Chlorpromazine) [сп]	Ін'єкції: 25 мг (гідрохлорид)/мл в ампулах по 2 мл. Таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг (гідрохлорид). <i>[-]</i> Оральна рідина: 25 мг (гідрохлорид)/5мл <i>[-]</i> Таблетки: 10 мг (гідрохлорид)
Галоперидол (Haloperidol) [сп]	Розчин для ін'єкцій: 5 мг в 1 мл ампулах. Таблетки: 5 мг. <i>[-]</i> Оральна рідина: 2мг/мл <i>[-]</i> Тверда оральна лікарська форма: 0,5мг, 2 мг.
Клозапін (Clozapine)	Тверда оральна лікарська форма: 25 - 100 мг.
24.2 Лікарські засоби, що застосовуються при порушеннях настрою	
24.2.1 Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах	
Амітриптилін (Amitriptyline)	Таблетки: 25 мг (гідрохлорид). <i>[-]</i> Таблетки: 75 мг (гідрохлорид).
Флуоксетин (Fluoxetine)	Тверда оральна лікарська форма: 20 мг (як гідрохлорид).
<i>Додатковий перелік [сп]</i>	
Флуоксетин (Fluoxetine) ☒	Тверда оральна лікарська форма: 20 мг (як гідрохлорид). ☒ > 8 років.
24.2.2 Лікарські засоби, що застосовуються при біполярних розладах	
Карбамазепін (Carbamazepin)	Таблетки ділимі (з ризикою): 200 мг; <i>[-]</i> Таблетки ділимі (з ризикою): 100 мг
Літій (Lithium)	Тверда оральна лікарська форма: 300 мг.
Вальпроєва кислота /Вальпроат натрію (Valproic acid /Sodium valproate)	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії: 500 мг (натрію вальпроат). <i>[-]</i> Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії: 200 мг (натрію вальпроат).
24.3 Лікарські засоби при тривожних розладах	
Діазепам (Diazepam)	Таблетки поділена (з ризикою): 5 мг; <i>[-]</i> Таблетки поділена (з ризикою): 2 мг
24.4 Лікарські засоби, що застосовуються при obsесивно- компульсивних розладах	
Кломіпрамін (Clomipramine)	Таблетки: 25 мг <i>[-]</i> Капсули: 10 мг (гідрохлорид)

24.5 Лікарські засоби для лікування розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин	
Нікотинамова замісна терапія (НЗТ)(Nicotine replacement therapy (NRT))	Жувальна гумка: 2 мг; 4 мг (як полакрілекс). Трансдермальний пластир: 10 мг/16 годин; 15 мг/16 годин; 25 мг/16 годин; 7 мг/24 годин; 14мг/24 годин; 21 мг/24 годин.
<i>Додатковий перелік</i>	
Метадон (Methadone)*	Оральна рідина: 5 мг/5 мл (гідрохлорид) * повинен бути використаний тільки в межах програми підтримки. [-] Концентрат для оральної рідини: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гідрохлорид) [-] Оральна рідина: 10 мг/5 мл (гідрохлорид)
25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ	
25.1 Антиастматичні засоби і лікарські засоби для лікування хронічної обструктивної хвороби	
Беклометазон (Beclometasone)	Інгаляція (аерозоль): 50 мкг; 100 мкг (дипропіонат) на дозу (у вигляді форм, що не містять фреон); 250 мкг на дозу (у вигляді форм, що не містять фреон).
Будесонід (Budesonide) [д]	Інгаляція (аерозоль) або порошок для інгаляцій: 100 мкг на дозу; 200 мкг на дозу.
Епінефрин/Адреналін (Epinephrine /Adrenaline)	Розчин для ін'єкцій: 1,8 мг/мл по 1 мл в ампулах. [-] Розчин для ін'єкцій: 1 мг (гідрохлорид або гідротартрат) в 1-мл ампулі
[-] Іпратропію бромід (Ipratropium bromide)	[-] Інгаляція (аерозоль): 20 мікрограмів/визначеної дози.
Сальбутамол (Salbutamol)	Інгаляція (аерозоль): сальбутамол 100 мкг (1 доза) Дозований інгалятор (аерозоль): 100 мкг (сульфату) на 1 дозу [-] Розчин для ін'єкцій: 50 мікрограмів (як сульфат)/мл в 5-мл ампулі [-] Респіраторний розчин для використання в розпилювачах: 5 мг (як сульфат)/мл
26. Розчини, що коригують водний, електролітний та кислотно-лужний баланс	
26.1 Оральні лікарські засоби	
Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)	Див. розділ 17.5.1.
Калію хлорид (Potassium chloride)	[-] Порошок для розчину
26.2 Парентеральні лікарські засоби	
Глюкоза (Glucose)	Розчин для ін'єкцій: 5% (ізотонічний). Розчин для ін'єкцій: 10% (гіпертонічний) [-] Розчин для ін'єкцій: 50% (гіпертонічний)
[-] Глюкоза з Натрію хлоридом (Glucose with Sodium chloride)	[-] Розчин для ін'єкцій: 4% глюкоза, 0.18% натрію хлорид (еквівалентно Na+ 30 ммоль/л, Cl- 30 ммоль/л). [-] Розчин для ін'єкцій: 5% глюкоза, 0.9% натрію хлорид (еквівалентно 150 ммоль/л Na+ та 150 ммоль/л Cl-); 5% глюкоза, 0.45% натрію хлорид (еквівалентно 75 ммоль/л Na+ та 75 ммоль/л Cl-) [d]
Калію хлорид (Potassium chloride)	Розчин для розведення: 7,5% (еквівалентно K 1 ммоль/мл та Cl 1 ммоль/мл) [д]. [-] Розчин для розведення: 11.2% в 20-мл ампулі (еквівалентно K+ 1.5 ммоль/мл, Cl- 1.5 ммоль/мл). [-] Розчин для розведення: 15% (еквівалентно K 2 ммоль/мл та Cl 2 ммоль/мл) [d]
Натрію хлорид (Sodium chloride)	Розчин для ін'єкцій: 0,9% ізотонічний (еквівалентно Na+ 154 ммоль/л, Cl- 154 ммоль/л).
Натрію гідрокарбонат (Sodium	[-] Розчин для інфузій: 8,4% в ампулах по 10 мл

hydrogen carbonate)	(еквівалентно Na+ 1000 ммоль/л, HCO3- 1000 ммоль/л) [-] Розчин для ін'єкцій 1.4% ізотонічний (еквівалентно Na+ 167 ммоль/л, HCO3- 167 ммоль/л) Розчин для інфузій: 8,4% в 100 мл; в 50 мл у пляшках
Розчини електролітів	Розчини
26.3 Змішані	
Вода для ін'єкцій (Water for injection)	Розчин для ін'єкцій: 2-мл; 5-мл; 10-мл ампулах.
27. ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ	
Аскорбінова кислота (Ascorbic acid)	Таблетки: 50 мг
Кальцій (Calcium)	Таблетки: 500 мг
[-] Холекальциферол (Cholecalciferol)* [θ]	[-] Оральна рідина: 400 ОД/мл [-] Тверда пероральна лікарська форма: 400 ОД; 1000 ОД * Ергокальциферол може використовуватись, в якості альтернативи.
Ергокальциферол (Ergocalciferol)	Розчин оральний, олійний у флаконах: 1,25 мг/мл (50 000 МО/мл) по 10 мл. [-] Розчин оральний: 250 мкг/мл (10 000 МО / мл). [-] Тверда пероральна лікарська форма: 1.25 мг (50 000 ОД)
Йод (Iodine)	[-] Капсули: 200 мг [-] Олійний розчин йоду 1 мл (480 мг йоду); 0.5 мл (240 мг йоду) в ампулі (пероральний або для ін'єкцій); 0.57 мл (308 мг йоду) в дозованій пляшці.
[-] Нікотинамід (Nicotinamide)	[-] Таблетки: 50 мг
[-] Піридоксин (Pyridoxine)	[-] Таблетки: 25 мг (гідрохлорид)
Ретинол (Retinol)	Капсули: 100 000 ОД (у вигляді пальмітату); Оральний олійний розчин: 100 000 ОД (як пальмітат)/мл в мультидозованому дозаторі. [-] Капсули: 50 000 ОД; 200 000 ОД (у вигляді пальмітату) [-] Таблетки (вкриті цукром): 10 000 ОД (як пальмітат) [-] Водно-змішуючий ін'єкційний розчин: 100 000 ОД (як пальмітат) в 2-мл ампулі
[-] Рибофлавін (Riboflavin)	[-] Таблетки: 5 мг
Натрію фторид (Sodium fluoride)	У будь-якій відповідній формі для місцевого застосування
Тіамін (Thiamine)	[-] Таблетки: 50 мг (гідрохлорид) Розчин для ін'єкцій
Додатковий перелік	
Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл в 10-мл ампулі.
28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУХА, ГОРЛА ТА НОСА У ДІТЕЙ [д]	
[-] Оцтова кислота (Acetic acid)	[-] Місцево: 2%, в спирті
Будесонід (Budesonide)	[-] Назальний спрей: 100 мікрограмів на дозу Спрей назальний дозований, суспензія; 50 мкг/доза
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	Краплі очні/вушні: 0,3% краплі (гідрохлорид).
Ксилометазолін (Xylometazoline) ☑	Назальний спрей: 0,05%; ☑ Не для дітей віком до 3 місяців.
29. СПЕЦІАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМИ	
29.1 Лікарські засоби, що призначаються немовлятам [д]	
[-] Кофеїну цитрат (Caffeine citrate)	[-] Розчин для ін'єкцій: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну бази/мл) [-] Оральна рідина: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну бази/мл)

<i>[-]</i> Хлоргекседин (Chlorhexidine)	<i>[-]</i> Розчин або гель: 7,1% (диглуконат) забезпечуючи 4% хлоргексидин (для догляд за пупкової ранюю).
<i>Додатковий перелік</i>	
Ібупрофен (Ibuprofen)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг/мл.
<i>[-]</i> Простагландин Е (Prostaglandin E)	<i>[-]</i> Розчин для ін'єкцій: Простагландин Е1 - 0.5 мг/мл в спирті, Простагландин Е2 - 1 мг/мл
Легеневі сурфактанти (Surfactant)	Суспензія для введення в трахею: 25 мг/мл <i>[-]</i> Суспензія для введення в трахею: 80 мг/мл.
29.2 Лікарські засоби, що застосовують матері новонароджених	
Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл (у вигляді солі натрію фосфату).
30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СУГЛОБІВ	
30.1 Лікарські засоби для лікування подагри	
Алопуринол (Allopurinol)	Таблетки: 100 мг
30.2. Модифікуючі лікарські засоби, що використовуються при ревматичних хворобах (DMARDs)	
Хлорохін (Chloroquine)	<i>[-]</i> Таблетки: 100 мг; 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату) Таблетки: 250 мг (у вигляді фосфату).
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>[-]</i> Азатіоприн (Azathioprine)	<i>[-]</i> Таблетки: 50 мг.
Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) <i>[сп]</i>	Таблетки: 200 мг (у вигляді сульфату).
Метотрексат (Methotrexate)	Таблетки: 2,5 мг (у вигляді натрієвої солі)
Пеніциламін (Penicillamine)	Таблетки: 250 мг.
Сульфасалазин (Sulfasalazine)	Таблетки: 500 мг.
30.3. Лікування ювенільного артриту [д]	
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)*	Таблетки: від 100 мг до 500 мг* Для використання при ревматизмі, ювенільному артриті, хворобі Кавасакі <i>[-]</i> Супозиторії: 50 мг до 150 мг

Примітки.

1. Цей Національний перелік розроблений на основі 18-го видання Переліку основних лікарських засобів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я, включає препарати, які зареєстровані в Україні і складається з:

основного переліку, до якого включені найбільш ефективні, безпечні лікарські засоби з найвищими показниками вартість-ефективність для пріоритетних станів. Пріоритетні стани відбираються виходячи з сучасної та очікуваної значущості для охорони здоров'я і можливостей для безпечного лікування з найвищими показниками вартість-ефективність;

додаткового переліку, до якого включені основні лікарські засоби для пріоритетних захворювань, що потребують спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців. У разі сумнівів лікарські засоби також можуть бути включені до основного переліку як додаткові з урахуванням сталої високої вартості чи меншої привабливості ефективності витрат в різних умовах.

2. У цьому Національному переліку застосовуються такі символи:

() - призначений для зазначення аналогічного клінічного ефекту в межах фармакологічного класу. Лікарський засіб у Національному переліку повинен бути прикладом класу, для якого існують найкращі докази ефективності та безпеки (перший зареєстрований лікарський засіб або наступні зареєстровані лікарські засоби, які можуть бути більш безпечними чи мати кращий показник вартість-користь). У разі відсутності різниці в інформації щодо ефективності та безпеки до Національного переліку включається лікарський засіб за найнижчою ціною з урахуванням міжнародних джерел інформації про ціни на лікарські засоби. Не всі лікарські засоби з таким символом можна застосовувати під час вибору лікарського засобу для дітей. Терапевтична еквівалентність зазначається лише на основі доказів щодо ефективності та безпеки;

☑ - свідчить про те, що є обмеження за віком або вагою для використання лікарського засобу. Особливості застосування для кожного лікарського засобу зазначені у додатку 2;

[сп] - наводиться у додатковому переліку і означає, що застосування лікарського засобу вимагає спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців для використання під час лікування дітей;

[д] - наводиться за конкретним лікарським засобом або силою дії лікарського засобу і означає, що є спеціальні вказівки щодо обмеження його використання для дітей;

[-] - означає, що лікарський засіб або його форма випуску не внесена до Державного реєстру лікарських засобів України.

3. Лікарські засоби та лікарські форми наведені в кожному розділі цього Національного переліку в алфавітному порядку без переваг однієї форми над іншою.

4. Основні терміни, що використовуються для лікарських форм у цьому Національному переліку, наведені у додатку 2. Визначення термінів та вимоги до якості, що застосовуються до різних лікарських форм, відповідають вимогам Державної Фармакопеї України.

Додаток 1 до Національного переліку

Лікарські засоби, що мають обмеження до застосування за вагою або віком

Атазанавір	>25 кг
Атропін	>3 місяців
Бензил бензоат	>2 років
Бетаметазон, топічні форми	Для новонароджених перевага надається гідрокортизону
Цефазолін	>1 місяця
Цефтріаксон	>41 тижня з урахуванням внутрішньочеревного розвитку
Дилоксанід	>25 кг
Доксициклін	>8 років (окрім серйозних інфекцій, наприклад, холери)
Ефавіренз	>3 років або >10 кг
Емтрицитабін	>3 місяців
Флуоксетин	>8 років
Ібупрофен	>3 місяців (окрім IV стадії відкритого артеріального протоку)
Мефлохін	>5 кг або >3 місяців
Метоклопрамід	Не використовувати у новонароджених
Ондансетрон	>1 місяць
Саквінавір	>25 кг
Сульфадіазин срібла	>2 місяців
Тетракаїн	Не використовувати у новонароджених
Триметоприм	>6 місяців
Ксилоретазолін	>3 місяців

Додаток 2 до Національного переліку

Пояснення до лікарських форм, які визначені у Національному переліку основних лікарських засобів.

1. Основні лікарські форми, які використовуються для орального застосування:

Термін	Визначення
Тверді оральні лікарські форми	Відноситься до таблеток або капсул або інших твердих лікарських форм, що "розчиняються", які є препаратами з негайним вивільненням. Це означає, що немає ніякої різниці в клінічній ефективності та безпеці між доступними лікарськими формами, і тому слід обирати форму(и), які внесені до переліку, в залежності від якості та доступності. Термін «тверда оральна лікарська форма» не застосовується до таблеток з модифікованим вивільненням.
Таблетки	Відноситься до: • неокритих або окритих (плівкою або цукровою оболонкою) таблеток, призначених для ковтання цілими; • з ризикою та без ризику *

	• таблетки, які призначені для жування перед ковтанням; • таблетки, що диспергуються або розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням; • таблетки, що призначені для подрібнення перед ковтанням. Термін «таблетка» без подальших уточнень» не застосовується до таблеток з модифікованим вивільненням.
Таблетки (категорії)	Відноситься до конкретних типів таблеток: жувальні – таблетки, призначені для жування перед ковтанням; що диспергуються - таблетки, що диспергуються або розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням; розчинні - таблетки, які розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням; подрібнювані - таблетки, що призначені для подрібнення перед ковтанням; з ризикою – таблетки, що мають місце для розлому для отримання дози менше 1 таблетки; сублінгвальні - таблетки, які призначені для розміщення під язик. Термін "таблетка" кваліфікується додатковим терміном (у дужках) у випадках, де мається на увазі один з наступних типів таблеток: гастрорезистентні (такі таблетки можуть іноді бути описані як вкриті кишковорозчинною оболонкою або з відстроченим вивільненням), з пролонгованим вивільненням або інші форми з модифікованим вивільненням.
Капсули	Відноситься до твердих або м'яких капсул. Термін «Капсула» без подальших уточнень » не застосовується до капсул з модифікованим вивільненням.
Капсули (категорії)	Термін «капсула» з вказанням категорії відноситься до гастрорезистентних (такі капсули можуть іноді бути описані як вкриті кишковорозчинною оболонкою або з відстроченим вивільненням), з пролонгованим вивільненням або інші форми з модифікованим вивільненням.
Гранули	Препарати, які видаються пацієнту у вигляді гранул для ковтання без жодної додаткової підготовки, для жування, або для прийому з водою або іншою рідиною. Термін "гранули", без подальших уточнень не застосовується до гранул з модифікованим вивільненням.
Порошок для орального застосування	Препарати, які видаються пацієнту у вигляді порошку (зазвичай у вигляді однієї дози) для прийому з водою або іншою рідиною.
Рідина для орального застосування	Рідкі препарати, призначені для ковтання, тобто оральні розчини, суспензії, емульсії та оральний краплі, в тому числі відновлені з порошоків або гранул, але не відноситься до препаратів, що призначені для введення через слизову оболонку рота, наприклад, рідини для полоскання горла або полоскання ротової порожнини. Рідини для орального застосування, представлені у вигляді порошоків або гранул, можуть мати переваги завдяки більшій стабільності та меншим транспортним витратам. Якщо на ринку наявні більше одного типу рідин для орального застосування є (наприклад, розчин, суспензія, гранули для відновлення), вони можуть бути взаємозамінними і в таких випадках мають бути біоеквівалентними. Перевага надається рідинам для орального застосування, що не містять цукру, та рідинам для дітей, що не містять спирту.

*Таблетки з ризикою можуть бути розділені для полегшення ковтання, забезпечуючи дозу цілої таблетки.

2. Основні лікарські форми, які використовуються для парентерального застосування:

Термін	Визначення
Ін'єкція	Відноситься до розчинів, суспензій та емульсій, включаючи ті, що отримані з порошоків або концентрованих розчинів.

Ін'єкція (категорії)	Шлях введення вказується у дужках за необхідності.
Ін'єкція (олійна)	Термін «ін'єкція» у відповідних записах містить уточнення (олійна).
Внутрішньовенна інфузія	Відноситься до розчинів, суспензій та емульсій, включаючи ті, що утворюються з порошків або концентрованих розчинів.

3. Інші лікарські форми:

Шлях введення	Термін, що використовується
Очні	Для очних крапель, очних мазей.
Топічні	Для рідин: лосьйони, в'язкі рідини, що наносяться спеціальним засобом (пензликом). Для напівтвердих речовин: крем, мазь.
Ректальні	Супозиторії, гелі або розчини.
Вагінальні	Пессарії або вагінальні таблетки.
Інгаляційні	Порошок для інгаляцій, інгаляція у балонах, небулайзер.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2015 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 61) викласти в такій редакції:

“Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів.”.

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825) викласти в такій редакції:

“1. Установити:

1) на лікарські засоби та медичні вироби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків, що не перевищують такі розміри:

Закупівельна ціна, гривень	Торговельна (роздрібна) надбавка, відсотків
До 100 (включно)	25
Більше ніж 100 до 300 (включно)	23
Більше ніж 300 до 500 (включно)	20
Більше ніж 500 до 1000 (включно)	15
Більше ніж 1000	10

2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) і медичні вироби, оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожен лікарський засіб, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу, усі типи, види, марки виробів медичного призначення не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні.”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 “Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 54):

1) абзац другий підпункту 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

“лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, та/або галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі - лікарські засоби);”;

2) абзац другий пункту 1 Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, та/або галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі - лікарські засоби);”.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 2015 р. №

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 “Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету” (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 480).

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1499 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2073).

3. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906).
