

Додаток 1

до Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (пункт 3)

Особливості медичного застосування лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовами	Особливості медичного застосування	
І. Анестетики		
Додатковий перелік		
Ефедрин (Ephedrine)	* Для спинномозкової анестезії під час пологів з метою профілактики гіпотензії.	
II. Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги		
1. Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НПЗЗ)		
Ібупрофен (Ibuprofen)	☑ Не призначати дітям до 3 місяців.	
Парацетамол (Paracetamol)	* Не рекомендується застосовувати як нестероїдний протизапальний засіб.	
3. Лікарські засоби для симптоматичної фармакотерапії у паліативній допомозі / Лікарські засоби для усунення інших поширених симптомів у паліативній допомозі		
Флуоксетин (Fluoxetine)	☑ >8 років.	
Ондансетрон (Ondansetron)	☑ >1 місяця.	
III. Протиалергічні лікарські засоби та лікарські засоби, що використовуються при анафілаксії		
Лоратадин (Loratadine)	* H1-гістаміноблокатори першого покоління не рекомендовано застосовувати при анафілаксії.	
V. Протисудомні/протиепілептичні засоби		
Магнію сульфат (Magnesium sulfate)	* Для медичного застосування при еклампсії та важкій прееклампсії, не застосовується при інших видах судом.	
Мідазолам (Midazolam)	* Ампула: 1 мг/мл; 10 мг/мл	Для булаьного введення, у випадку, коли

		оромукозний розчин не доступний.
VI. Протипікційні лікарські засоби		
Додатковий перелік		
Оксамніхін (Oxamniquine)	* Призначається, у разі, коли лікування празиквантелом не є ефективним.	
2. Антибактеріальні лікарські засоби		
Бета-лактамі антибіотики		
Цефазолін (Cefazolin)	* Для хірургічної профілактики. ☑ >1 місяця.	
Цефіксим (Cefixime)	* Лише для лікування однією дозою неускладненої аногенітальної гонореї.	
Цефтріаксон (Ceftriaxone)	* Не призначається з кальцієм та новонародженим з гіпербілірубінемією. ☑ >41 тижнів гестаційного віку.	
Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin)	* Не рекомендований як лікарський засіб першої лінії терапії для лікування неонатального сепсису, окрім як за умови високої смертності новонароджених під професійним наглядом, у випадках, коли лікування у лікарні неможливе.	
Додатковий перелік		
Цефотаксим (Cefotaxime)	* Цефалоспорины 3-го покоління є лікарськими засобами вибору для медичного застосування у госпіталізованих новонароджених.	
Іміпенем + Циластатин (Imipenem + Cilastatin)	* Лише для лікування внутрішньолікарняних інфекцій, що загрожують життю, через підозрювану або доведену інфекцію, резистентну до комбінованої терапії.	
Інші антибактеріальні лікарські засоби		
Азитроміцин (Azithromycin)	* Лише для лікування одноразовою дозою статевого хламідіозу та трахоми.	
Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	* Олійна суспензія для ін'єкцій по 0.5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл по 2 мл в ампулах.	Лише для пробного лікування епідемічного менінгіту у дітей > 2 років.
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	* Для дорослих та дітей віком від 14 років.	
Кларитроміцин (Clarithromycin)	* Для комбінованої терапії з метою ерадикації H. Pylori у дорослих.	
Доксициклін (Doxycycline)	☑ Використання у дітей віком до 8 років допустиме лише для лікування інфекцій, що	

	загрожують життю, за відсутності альтернатив.
Протитуберкульозні лікарські засоби	
Рифабутин (Rifabutin)	* Лише для медичного застосування у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, які застосовують інгібітори протеази.
Рифапентин (Rifapentine)	* Лише для лікування латентної форми туберкульозу.
4. Противірусні лікарські засоби	
Антиретровірусні лікарські засоби	
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази	
Ефавіренз (Efavirenz)	☒ >3 років або >10 кг.
Інгібітори протеази	
Атазанавір (Atazanavir)	☒ >25 кг.
Саквінавір (Saquinavir)	☒ >25 кг. * Застосовується при неможливості медичного застосування інших лікарських засобів.
Інші противірусні засоби	
Озельтамівір (Oseltamivir)	* Для лікування потенційно важких або ускладнених захворювань у разі підтвердженої або передбачуваної вірусної інфекції грипу відповідно до основних принципів лікування.
Рибавірин (Ribavirin)	* Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С.
Лікарські засоби проти гепатиту	
Інші противірусні засоби	
Рибавірин (Ribavirin)	* Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С.
Додатковий перелік	
Пегільований інтерферон альфа (2a або 2b) (Pegylated interferon alfa (2a or 2b))	* Для медичного застосування в комбінації з рибавірином.
5. Засоби для лікування протозойних інфекцій	
Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу	
Дилоксанід (Diloxanide)	☒ >25 кг.
Засоби для лікування малярії	
Амодіахін (Amodiaquine)	* Для медичного застосування у комбінації з артесунатом 50 мг.

Артеметер (Artemether)	* Для лікування важкої малярії.	
Артеметер+Лумефантрін (Artemether+Lumefantrine)	* Не рекомендований у першому триместрі вагітності або дітям вагою до 5 кг.	
Артезунат (Artesunate)	* Для медичного застосування в комбінації з амодіахіном або мефлохіном або сульфадоксином + піриметаміном.	
	Ін'єкції:	* Для лікування тяжкої форми малярії.
	Ректальна лікарська форма:	* Лише для попереднього лікування важкої малярії; пацієнти повинні бути направлені до відповідного медичного закладу для подальшого спостереження.
Артезунат+Амодіахін (Artesunate+Amodiaquine)	* Комбінації, що забезпечують необхідні цільові дози, такі як 153 мг або 200 мг (у вигляді гідрохлориду) разом з 50 мг артезунату можуть бути альтернативою.	
Хлорохін (Chloroquine)	* Лише для лікування інфекції, спричиненої P.vivax (у вигляді фосфату або сульфату).	
Доксициклін (Doxycycline)	* Для медичного застосування лише в поєднанні з хініном.	
Мефлохін (Mefloquine)	* Для медичного застосування у комбінації з артезунатом 50 мг.	
Прімахін (Primaquine)	* Використовується впродовж 14 днів лише для лікування інфекції, спричиненої P.vivax та P.ovale.	
Хінін (Quinine)	* Лише для лікування тяжкої малярії при медичному застосуванні у комбінації з доксицикліном.	
Сульфадоксин+Піриметамін (Sulfadoxine+Pyrimethamine)	* Для медичного застосування лише у комбінації з артезунатом 50 мг.	
Для профілактики малярії		
Хлорохін (Chloroquine)	* Для лікування інфекції, що спричинена P.vivax.	
Доксициклін (Doxycycline)	☑ >8 років.	
Мефлохін (Mefloquine)	☑ >5 кг або >3 місяців.	
Прогуаніл (Proguanil)	* Для медичного застосування тільки у комбінації з хлорохіном.	
VIII. Антинеопластичні та імуносупресивні лікарські засоби		
2. Цитотоксичні та ад'ювантні лікарські засоби		

<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Бендамустин (Bendamustine)</i>	<i>* Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, фолікулярної лімфоми.</i>
<i>Блеоміцин (Bleomycin)</i>	<i>* Для лікування лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок.</i>
<i>Кальцію фолінат (Calcium folinate)</i>	<i>* Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, гестаційної трофобластичної неоплазії, метастатичного колоректального раку, остеосаркоми, лімфоми Беркітта.</i>
<i>Капецитабін (Capecitabine)</i>	<i>* Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, метастатичного раку молочної залози, метастатичного колоректального раку.</i>
<i>Карбоплатин (Carboplatin)</i>	<i>* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, епітеліального раку яєчників, раку носоглотки, недрібноклітинного раку легень, остеосаркоми, ретинобластоми.</i>
<i>Хлорамбуцил (Chlorambucil)</i>	<i>* Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії.</i>
<i>Цисплатин (Cisplatin)</i>	<i>* Для лікування раку шийки матки (як радіо-сенсibilізатор), раку голови і шиї (як радіо-сенсibilізатор), раку носоглотки (як радіо-сенсibilізатор), недрібноклітинного раку легень, остеосаркоми, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок.</i>
<i>Циклофосфамід (Cyclophosphamide)</i>	<i>* Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, дифузної В-великоклітинної лімфоми, ранньої стадії раку молочної залози, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, фолікулярної лімфоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта, метастатичного раку молочної залози.</i>
<i>Цитарабін (Cytarabine)</i>	<i>* Для лікування гострої мієлобластної лейкемії, гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії, лімфоми Беркітта.</i>
<i>Дакарбазин (Dacarbazine)</i>	<i>* Для лікування лімфоми Ходжкіна.</i>
<i>Дактиноміцин</i>	<i>* Для лікування гестаційної трофобластичної</i>

<i>(Dactinomycin)</i>	<i>неоплазії, рабдоміосаркоми, пухлини Вільмса.</i>
<i>Даунорубіцин (Daunorubicin)</i>	<i>* Для лікування гострої мієлобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії, гострої лімфобластної лейкемії.</i>
<i>Доцетаксел (Docetaxel)</i>	<i>* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози, метастатичного раку передміхурової залози.</i>
<i>Доксорубіцин (Doxorubicin)</i>	<i>* Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, ранньої стадії раку молочної залози, лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, фолікулярної лімфоми, метастатичного раку молочної залози, остеосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, пухлини Вільмса, лімфоми Беркітта.</i>
<i>Етопозид (Etoposide)</i>	<i>* Для лікування зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, недрібноклітинного раку легень, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, ретинобластоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта.</i>
<i>Флударабін (Fludarabine)</i>	<i>* Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії.</i>
<i>Фторурацил (Fluorouracil)</i>	<i>* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, метастатичного колоректального раку, раку носоглотки.</i>
<i>Філграстим (Filgrastim)</i>	<i>* Для первинної профілактики у пацієнтів з високим ризиком розвитку фебрильної нейтропенії, пов'язаної з мієлотоксичністю хіміотерапії; вторинної профілактики пацієнтів, в яких розвинулась нейтропенія, пов'язана з мієлотоксичністю хіміотерапії; полегшення введення дози подальшого курсу хіміотерапії.</i>
<i>Гемцитабін (Gemcitabine)</i>	<i>* Для лікування епітеліального раку яєчників, недрібноклітинного раку легень.</i>
<i>Іфосфамід (Ifosfamide)</i>	<i>* Для лікування зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, остеосаркоми, рабдоміосаркоми,</i>

	<i>саркоми Юінга.</i>
<i>Іматиніб (Imatinib)</i>	<i>* Для лікування хронічної мієлоїдної лейкемії, гастроінтестинальної стромальної пухлини шлунка.</i>
<i>Іринотекан (Irinotecan)</i>	<i>* Для лікування метастатичного колоректального раку.</i>
<i>Меркаптопурин (Mercaptopurine)</i>	<i>* Для лікування гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії.</i>
<i>Метотрексат (Methotrexate)</i>	<i>* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, гестаційної трофобластичної неоплазії, остеосаркоми, гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії.</i>
<i>Оксаліплатин (Oxaliplatin)</i>	<i>* Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, метастатичного колоректального раку.</i>
<i>Паклітаксел (Paclitaxel)</i>	<i>* Для лікування епітеліального раку яєчників, ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози, саркоми Капоші, раку носоглотки, недрібноклітинного раку легень, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників.</i>
<i>Ритуксимаб (Rituximab)</i>	<i>* Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, хронічної лімфоцитарної лейкемії, фолікулярної лімфоми.</i>
<i>Вінбластин (Vinblastine)</i>	<i>* Для лікування лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників.</i>
<i>Вінкристин (Vincristine)</i>	<i>* Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, фолікулярної лімфоми, ретинобластоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, пухлини Вільмса, лімфоми Беркітта.</i>
<i>Вінорелбін (Vinorelbine)</i>	<i>* Для лікування недрібноклітинного раку легень, метастатичного раку молочної залози.</i>
3. Гормони та антигормони	
Додатковий перелік	
<i>Анастрозол (Anastrozole)</i>	<i>* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози.</i>
<i>Бікалутамід (Bicalutamide)</i>	<i>* Для лікування метастатичного раку передміхурової залози.</i>
<i>Дексаметазон</i>	<i>* Для лікування гострої лімфобластної лейкемії.</i>

(Dexamethasone)		
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	* Для лікування гострої лімфобластної лейкемії.	
Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	* Для лікування гострої лімфобластної лейкемії.	
Преднізолон (Prednisolone)	* Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, дифузної В-великоклітинної лімфоми, лімфоми Ходжкіна, фолікулярної лімфоми, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта.	
Тамоксифен (Tamoxifen)	* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози.	
Х. Лікарські засоби, що впливають на кров		
1. Антианемічні лікарські засоби		
Заліза сіль + Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)	* Для медичного застосування у вагітних.	
Фолієва кислота (Folic acid)	Таблетки: 400 мкг	* Для профілактики та лікування перших проявів дефектів нервової трубки.
XI. Препарати крові та плазмозамінні лікарські засоби людського походження		
2. Препарати на основі (похідні) плазми крові		
Додатковий перелік		
Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	Внутрішньом'язове введення: 16% розчин протеїну Підшкірне введення: 15%; 16% розчин протеїну	* Призначений для первинного імунодефіциту (підшкірне та внутрішньом'язове введення).
	Внутрішньовенне введення: 5%; 10% розчин протеїну	** Призначений для первинного імунодефіциту та хвороби Кавасакі (внутрішньовенне введення).
XII. Лікарські засоби для лікування серцево-судинної системи		
3. Антигіпертензивні лікарські засоби		
Гідралазин (Hydralazine)	* Лише для лікування тяжкої гіпертензії, індукованої вагітністю. Не рекомендується при есенціальній гіпертензії у зв'язку з наявністю суттєвіших доказів ефективності та безпеки інших лікарських засобів.	

Метилдопа (Methyldopa)	* Лише для медичного застосування при гіпертензії у вагітних. Медичне застосування в лікуванні гіпертонічної хвороби не рекомендується у зв'язку з наявністю значної кількості даних про вищу ефективність і безпеку інших лікарських засобів.
6. Гіполіпідемічні лікарські засоби	
Симвастатин (Simvastatin)	* Для медичного застосування у пацієнтів з високим ступенем ризику.
XIII. Дерматологічні лікарські засоби (місцевого застосування)	
2. Антибактеріальні лікарські засоби	
Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	☒ >2 місяців.
3. Протизапальні та протисвербіжні лікарські засоби	
Бетаметазон (Betamethasone)	☒ Не рекомендується немовлятам.
5. Лікарські засоби для лікування педикульозу	
Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	☒ >2 років.
XVII. Лікарські засоби, що впливають на функцію шлунково-кишкового тракту	
<i>Додатковий перелік</i>	
Метоклопрамід (Metoclopramide)	☒ Не застосовується для новонароджених.
Ондансетрон (Ondansetron)	☒ >1 місяця.
5. Лікарські засоби, що застосовуються при діарей	
Лікарські засоби від діарей	
Сульфат цинку (Zinc sulfate)	* При гострій діарей застосовується як доповнення до солей для пероральної регідратації.
XVIII. Гормони, інші лікарські засоби, що використовуються при ендокринних захворюваннях	
3. Контрацептиви	
* Для жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю (стосується всіх МНН з групи).	
Інтравагінальні контрацептиви	
Прогестеронове вагінальне кільце (Progesterone vaginal ring)	* Для жінок, що годують грудьми не менше 4 разів на день.

5. Інсуліни та інші ліки, які використовуються для лікування діабету	
Глібенкламід (Glibenclamide) може бути використаний в якості альтернативи Гліклазиду (Gliclazide)	* Не застосовується у пацієнтів старше 60 років.
XIX. Імунобіологічні лікарські засоби	
2. Сироватки та імуноглобуліни	
Протиотрутний імуноглобулін (Anti-venom immunoglobulin)	* Точний тип визначається в залежності від клінічної ситуації.
XXI. Офтальмологічні лікарські засоби	
3. Місцеві анестетики	
Тетракаїн (Tetracaine)	☒ Не показаний для недоношених новонароджених.
5. Мідріатики	
Атропін (Atropine)	☒ >3 місяців.
XXII. Лікарські засоби, що впливають на міометрій	
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Міфепристон (Mifepristone) – Мізопроустол (Misoprostol)</i>	<i>* Медичне застосування потребує ретельного медичного нагляду.</i>
XXIV. Лікарські засоби для лікування психічних і поведінкових розладів	
2. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування порушення настрою	
Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах	
Флуоксетин (Fluoxetine)	☒ >8 років.
XXVIII. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа	
Ксилометазолін (Xylometazoline)	☒ Не застосовується для дітей віком до 3 місяців.