

Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Медикаменти для
громадян, хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити»

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	флакони	50 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 5 % (50 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	50 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення	—“—	100 мл, 10 % (100 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	10 мл, 15— 20 % (150— 200 мг/мл)	
Імуноглобулін людини нормальний для підшкірного введення	—“—	20 мл, 15— 20 % (150— 200 мг/мл)	
Інгібітор С1-естерази людини	флакони, ліофілізат для приготування розчину для внутрішньовенного введення	1 МО	
Анакінра	попередньо наповнені шприци	100 мг/0,67 мл	
Ітраконазол	капсули	100 мг	для дітей

Ітраконазол	флакони	150 мл № 1 з дозатором, розчин оральний, 10 мг/мл	—“—
Вориконазол	таблетки	50 мг	—“—
Вориконазол	—“—	200 мг	—“—
Вориконазол	флакони, порошок для розчину для інфузій	200 мг	—“—
Амфотерицин В	флакони, ліофілізат для розчину для інфузій	50 мг	—“—
Посаконазол	суспензія оральна	40 мг/мл, по 105 мл у флаконі	—“—
Колістиметат натрію	порошок для розчину для ін’єкцій або інфузій	1 млн. МО	—“—
Тейкопланін	флакони, ліофілізат для розчину для ін’єкцій	200 мг	—“—
Тейкопланін	—“—	400 мг	—“—
Філграстим	розчин для ін’єкцій	300 мкг/мл (30 млн. МО) по 1 мл у флаконі	—“—
Канакінумаб	ампули, флакони, шприци	150 мг	—“—
Сиролімум	таблетки	1 мг	—“—

**Заступник Міністра
охорони здоров’я**

Світлана ШАТАЛОВА