

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я
України 28.05.2021 № 1043

Зміни до зведених показників 100 % потреби лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»

Доповнити розділом 9 такого змісту:

«9. Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації»

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок)	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування	Примітка
Такролімус	таблетки, капсули	0,5 мг	66 927	66 927	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії	0,5 мг	68 163	68 163	
Такролімус	таблетки, капсули	1 мг	183 427	183 427	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії	1 мг	218 220	218 220	
Такролімус	—“—	3 мг	44 045	44 045	
Такролімус	таблетки, капсули	5 мг	25 938	25 938	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії	5 мг	16 645	16 645	
Циклоспорин	таблетки, капсули	25 мг	77 659	77 659	
Циклоспорин	—“—	50 мг	107 521	107 521	
Циклоспорин	—“—	100 мг	7 944	7 944	

Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат)	—“—	180 мг	786 502	786 502	
Мофетіла мікофенолат	—“—	250 мг	460 094	460 094	
Базиліксімаб	ампулули, флакони, шприц-тюбик	20 мг	42	42	
Еверолімус	таблетки, капсули	0,75 мг	9 323	9 323	
Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий	ампулули, флакони, шприц-тюбик	25 мг	469	469	
Азатіоприн	таблетки, капсули	50 мг	5 208	5 208	
Валганцикловір	—“—	450 мг	67 779	67 779	
Такролімус	гранули для оральної суспензії	0,2 мг	0	0	для дітей до 5 років
Такролімус	—“—	1 мг	0	0	—“—
Циклоспорин	розчин оральний у флаконі разом з дозувальним комплектом у коробці з картону пакувального	100 мг/мл по 50 мл у флаконі	10	10	—“—
Мофетіла мікофенолат	суспензія для перорального прийому у флаконі	1 г/5 мл по 110 г у флаконі	0	0	для дітей до 5 років

».

В.о. директора Фінансово-економічного департаменту

В. Лісовський