

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів
 України
 від 25 березня 2009 р. № 333
 (в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України
 від _____ р.
 № _____)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК основних лікарських засобів

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовою	Форма випуску, сила дії лікарського засобу
1. АНЕСТЕТИКИ	
1.1. Загальні анестетики та кисень	
1.1.1. Інгаляційні лікарські засоби	
[BOO3] Азоту закис (Nitrous oxide)	Медичний газ.
[BOO3] Кисень (Oxygen)	Медичний газ.
[ДФ] Ксенон (Xenon)	Медичний газ.
[ДФ] Метоксифлуран (Methoxyflurane)	Розчин для інгаляцій: 3 мл.
[ДФ] Севофлуран (Sevofluran)	Рідина для інгаляцій: 100%.
1.1.2. Ін'єкційні лікарські засоби	
[BOO3] Кетамін (Ketamine)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг (у вигляді гідрохлориду)/мл по 10 мл у флаконі.
[ДФ] Натрію оксибутират (Natrii oxybutyras)	Розчин для ін'єкцій: 200 мг/мл по 5 мл, по 10 мл в ампулах.
[ДФ] Пропофол (Propofol)	Емульсія для ін'єкцій: 1%.
[BOO3] Тіопентал (Thiopental)	Ліофілізат для розчину для ін'єкцій: 0,5 г; 1,0 г.

1.2. Місцеві анестетики	
[ДФ] Артикаїн + Епінефрин (Articain + Epinephrine)	Розчин для ін'єкцій: 40мг/0,01мг; 40мг/0,012мг; 40мг/0,05мг; 68мг/0,017мг; 68мг/0,0085мг; 40мг/0,006мг.
[ВООЗ] Бупівакаїн (Bupivacaine)	Розчин для ін'єкцій: 0,25% (гідрохлорид); 0,5% (гідрохлорид).
[ДФ] Бупівакаїн + Епінефрин (Bupivacain + Epinephrine)	Розчин для ін'єкцій: 5мг/0,005мг/мл в ампулах.
[ВООЗ] Лідокаїн (Lidocaine)	Розчин для ін'єкцій: 2% (гідрохлорид). Гель: 2,5 %.
[ДФ] Мепівакаїн (Mepivacaine)	Розчин для ін'єкцій: 3% по 1,8 мл.
[ДФ] Прокаїн (Procaine)	Розчин для ін'єкцій: 0,25%, 0,5%.
[ДФ] Ропівакаїн (Ropivacaine)	Розчин для ін'єкцій: 2 мг/мл, 7,5 мг/мл, 10 мг/мл в ампулах.
1.3. Передопераційна підготовка та забезпечення короткотривалих процедур	
[ВООЗ] Атропін (Atropine)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг (сульфат) в ампулах по 1мл.
[ВООЗ] Мідазолам (Midazolam)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг/мл.
[ВООЗ] Морфін (Morphine)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг (гідрохлорид) в ампулах по 1мл.
2. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ ТА НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ	
2.1. Неопіоїдні та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НСПЗЛЗ)	
[ВООЗ] Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)	Таблетки: 100 мг; 150 мг; 300 мг; 325 мг; 500 мг.
[ВООЗ] Ібупрофен (Ibuprofen)☑	Розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл. Таблетки 200 мг; 400 мг. ☑ Не для дітей віком до 3 місяців.
[ВООЗ] Парацетамол (Paracetamol)	Розчин для перорального застосування: 120 мг/5 мл. Супозиторії: 80 мг; 150 мг; 170 мг; 300 мг; 330 мг.

	Таблетки 100 мг; 125 мг; 160 мг; 200 мг; 250 мг; 325 мг; 500 мг.
2.2. Опіюїдні анальгетики	
[ДФ] Бупренорфін (Buprenorphine)	Таблетки: 2 мг, 4 мг, 8 мг. Розчин для ін'єкцій: 0,3 мг/мл в ампулах.
[ДФ] Буторфанол (Butorphanol)	Розчин для ін'єкцій: 0,2% по 1 мл у шприц-тюбиках.
[ВООЗ] Кодеїн (Codeine)	Таблетки: 30 мг (фосфат).
[ВООЗ] Морфін (Morphine)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг (морфіну гідрохлорид) по 1 мл у ампулах. Таблетки: 10 мг (морфіну сульфат).
[ДФ] Налбуфін (Nalbuphine)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах.
[ДФ] Трамадол (Tramadol)	Капсули: 50 мг. Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл в ампулах. Краплі оральні: 100 мг/мл. Супозиторії ректальні: 100 мг.
[ДФ] Тримеперидин (Trimeperidine)	Розчин для ін'єкцій: 20 мг/мл в ампулах.
[ДФ] Фентаніл (Fentanyl)	Розчин для ін'єкцій: 0,05 мг/мл в ампулах.
2.3. Лікарські засоби, для симптоматичної терапії у паліативній допомозі	
[ВООЗ] Амітриптилін (Amitriptyline)	Таблетки: 10 мг, 25 мг; 75 мг.
[ВООЗ] Галоперидол (Haloperidol)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг по 1мл в ампулах. Таблетки: 5 мг.
[ВООЗ] Гіосцин бутилбромід (Butylscopolamine)	Розчин для ін'єкцій: 20 мг/2 мл по 2 мл в ампулах.
[ВООЗ] Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл по 1мл в ампулі (у вигляді динатрієвої солі фосфату). Тверді оральні лікарські форми: 0,5 мг; 4 мг.
[ВООЗ] Діазепам (Diazepam)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг/мл. Таблетки: 5 мг; 10 мг.

[BOO3] Лактулоза (Lactulose) [Д]	Розчин оральний: 3,1-3,7 г/5мл.
[BOO3] Лоперамід (Loperamide)	Тверді оральні лікарські форми: 2 мг.
[BOO3] Метоклопрамід (Metoclopramide)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах. Таблетки: 10 мг (гідрохлорид).
[BOO3] Мідазолам (Midazolam)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг/мл; 5 мг/мл.
[BOO3] Ондансетрон (Ondansetron) [Д] ☒	Розчин для ін'єкцій: 2 мг /мл по 2 мл в ампулах (у вигляді гідрохлориду). Розчин оральний: 4 мг/5 мл. Таблетки: 4 мг; 8 мг. ☒ > 1 місяця.
[BOO3] Флуоксетин (Fluoxetine) ☒	Тверді оральні лікарські форми: 20 мг (у вигляді гідрохлориду). ☒ > 8 років.
3. ПРОТИАЛЕРГІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ АНАФІЛАКСІЇ	
[BOO3] Гідрокортизон (Hydrocortisone)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконі.
[BOO3] Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі динатрію фосфату).
[BOO3] Епінефрин/ Адреналін/(Epinephrine/ Adrenaline)	Розчин для ін'єкцій: 1,8 мг (у вигляді гідротартрат) по 1 мл в ампулах.
[BOO3] Лоратадин (Loratadine)*	Оральний розчин: 1 мг/мл. Таблетки: 10 мг. *седативні антигістамінні препарати можуть використовуватися для обмежених показань.
[BOO3] Преднізолон (Prednisolone)	Таблетки: 5 мг.
4. АНТИДОТИ ТА ІНШІ РЕЧОВИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОТРУЄННІ	
4.1. Неспецифічні	
[BOO3] Вугілля активоване (Medicinal charcoal)	Порошок для перорального застосування.

4.2. Специфічні	
[BOO3] Атропін (Atropine)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг (сульфат) по 1 мл в ампулах.
[BOO3] Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл по 5 мл в ампулах.
[BOO3] Налоксон (Naloxone)	Розчин для ін'єкцій: 400 мкг (гідрохлорид) по 1 мл в ампулах.
[BOO3] Пеніциламін (Penicillamine)	Тверді оральні лікарські форми: 250 мг.
Додатковий перелік	
[BOO3] Десферіоксамін (Deferoxamine)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг.
5. АНТИКОНВУЛЬСАНТИ/ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ	
[BOO3] Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)	Рідина для орального застосування: 50 мг/мл. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії: 300 мг; 500 мг (натрію вальпроат). Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні: 300 мг. Капсули по 300 мг, 500 мг.
[BOO3] Карбамазепін (Carbamazepine)	Суспензія оральна: 100 мг/5 мл. Таблетки: 200 мг.
[BOO3] Магнію сульфат (Magnesium sulphate)	Розчин для ін'єкцій: 250 мг/мл по 5 мл в ампулах; 250 мг/мл по 10 мл в ампулах.
[BOO3] Фенобарбітал (Phenobarbital)	Таблетки: 5 мг; 50 мг; 100 мг.
[BOO3] Фенітоїн (Phenytoin)	Тверді оральні лікарські форми: 117 мг.
6. ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
6.1. Антигельмінтні лікарські засоби	
6.1.1. Кишкові антигельмінтні лікарські засоби	
[BOO3] Альбендазол (Albendazole)	Таблетки (жувальні): 400 мг.
[BOO3] Левамізол (Levamisole)	Таблетки: 50 мг; 150 мг (у вигляді гідрохлориду).
[BOO3] Мебендазол (Mebendazole)	Таблетки (жувальні): 100 мг.

[BOO3]Празиквантел (Praziquantel)	Таблетки: 600 мг.
[BOO3]Пірантел (Pyrantel)	Розчин для перорального застосування: 50 мг (у вигляді ембонату або памоату)/мл. Таблетки (жувальні): 250 мг (у вигляді ембонату або памоату).
6.1.2. Антифіліарійні лікарські засоби	
[BOO3]Альбендазол (Albendazole)	Таблетки (жувальні): 400 мг.
6.1.3. Антишистосомічні та інші антитрематодні лікарські засоби	
[BOO3]Празиквантел (Praziquantel)	Таблетки: 600 мг.
6.2. Антибактеріальні лікарські засоби	
6.2.1. Бета-лактамі лікарські засоби	
[BOO3]Амоксицилін (Amoxicillin)	Порошок для приготування розчину для перорального застосування (у вигляді тригідрату): 125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл [д]. Таблетки: 250 мг; 500 мг (у вигляді тригідрату).
[BOO3]Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	Розчин для перорального застосування: 125 мг амоксициліну + 31,25 мг клавуланової кислоти/5 мл; 250 мг амоксициліну + 62,5 мг клавуланової кислоти/5 мл [д]. Таблетки: 500 мг амоксициліну (у вигляді тригідрату) + 125 мг клавуланової у вигляді калієвої солі).
[BOO3]Ампіцилін (Ampicillin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг; 1 г (у вигляді калієвої солі).
[BOO3]Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1,44 г бензилпеніциліну (= 2,4 млн. МО) у 5-мл флаконі.
[BOO3]Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 600 мг (= 1 млн. МО) (натрієвої або калієвої солі).
[BOO3]Цефалексин (Cefalexin) [д].	Гранули: по 33 г для 60 мл оральної суспензії, 125 мг/5 мл у флаконах (безводний). Порошок для оральної суспензії: 250 мг/5 мл (безводний).

	Капсули: 250 мг (у вигляді моногідрату).
^[BOO3] Цефазолін (Cefazolin) *☑	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі. *Для хірургічної профілактики. ☑ > 1 місяця.
^[BOO3] Цефіксим (Cefixime)	Капсули: 400 мг (у вигляді тригідрату).
^[BOO3] Цефтриаксон (Ceftriaxone) *☑	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі) у флаконі. *Не призначати з кальцієм і уникати у новонароджених з гіпербілірубінемією. ☑ > 41 тижнів гестаційного віку.
Додатковий перелік	
^[BOO3] Іміпенем + Циластатин (Imipenem + Cilastatin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг (у вигляді моногідрату) + 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі.
^[BOO3] Цефотаксим (Cefotaxime) * <i>[cn]</i> .	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг у флаконі (у вигляді натрієвої солі). * цефалоспорини 3-го покоління є препаратами вибору для використання у госпіталізованих новонароджених.
^[BOO3] Цефтазидим (Ceftazidime)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг; 1 г (у вигляді пентагідрату) у флаконі.
6.2.2. Інші антибактеріальні лікарські засоби	
^[BOO3] Азитроміцин (Azithromycin)	Капсули: 250 мг; 500 мг (безводний). Оральний розчин: 200 мг/5 мл.
^[BOO3] Гентаміцин (Gentamicin)	Розчин для ін'єкцій: 40 мг (у вигляді сульфату)/мл у 2-мл флаконах.
^[BOO3] Доксициклін (Doxycycline)☑	Тверді оральні лікарські форми: 100 мг (у вигляді гіклату). ☑ Використовувати у дітей <8 років тільки при загрозливих життю інфекціях, коли їм немає альтернативи.
^[BOO3] Еритроміцин (Erythromycin)	Таблетки: 250 мг.
^[BOO3] Кларитроміцин (Clarithromycin)	Таблетки: 500 мг.

[BOO3]Метронідазол (Metronidazole)	Розчин для інфузій: 500 мг у 100-мл флаконах. Супозиторії: 500 мг. Таблетки: 200 мг; 250 мг; 400 мг; 500 мг.
[BOO3]Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)	Таблетки: 100 мг.
[BOO3]Спектиноміцин (Spectinomycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 2 г (у вигляді гідрохлориду) у флаконі.
[BOO3]Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	Розчин для ін'єкцій: 80 мг + 16 мг/мл у 5 мл ампулах. Розчин для перорального застосування: 200 мг + 40 мг/5 мл. Таблетки: 100 мг + 20мг; 400 мг + 80 мг.
[BOO3]Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	Капсули: 250 мг. Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 0,5 г; 1 г (натрію сукцинат) у флаконі.
[BOO3]Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	Розчин для в/в інфузій: 2 мг/мл (у вигляді гіклату). [д] Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду).
Додатковий перелік	
[BOO3]Кліндаміцин (Clindamycin)	Капсули: 150 мг (у вигляді гідрохлориду). Розчин для ін'єкцій: 150 мг (у вигляді фосфату)/мл.
6.2.3. Антилепрозійні лікарські засоби	
Лікарські засоби для лікування прокази повинні завжди використовуватися у комбінації. Комбінована терапія є необхідною для запобігання виникненню резистентності до лікарських засобів. Забарвлені упаковки, що містять комбінації 2 лікарських засобів (малобацилярна проказа) або 3 лікарських засобів (мультибацилярна проказа) слід використовувати для лікування прокази у дорослих та дітей. Блістери для комбінованої терапії (MDT) можуть постачатися BOO3 безкоштовно.	
[BOO3]Клофазимін (Clofazimine)	Капсули: 50 мг; 100 мг.
[BOO3]Рифампіцин (Rifampicin)	Капсули: 150 мг; 300 мг.

6.2.4. Протитуберкульозні лікарські засоби	
ВООЗ рекомендує та погоджує використання фіксованих комбінацій, а також розробку нових належних фіксованих комбінацій, включаючи форми випуску з модифікованим вивільненням, незаморожених продуктів та педіатричних форм достовірної фармацевтичної якості.	
[ВООЗ]Етамбутол (Ethambutol)	Таблетки: 400 мг (гідрохлорид).
[ВООЗ]Етамбутол + Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	Таблетки: 275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг.
[ВООЗ]Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin)	Таблетки: 275 мг + 75 мг + 150 мг.
[ВООЗ]Ізоніазид (Isoniazid)	Таблетки: 100 мг; 200 мг; 300 мг.
[ВООЗ]Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)	Таблетки: 75 мг + 150 мг.
[ВООЗ]Піразинамід (Pyrazinamide)	Таблетки: 500 мг.
[ВООЗ]Рифабутин (Rifabutin)	Капсули: 150 мг.
[ВООЗ]Рифампіцин (Rifampicin)	Капсули: 150 мг; 300 мг.
[ВООЗ]Стрептоміцин (Streptomycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) у флаконі.
Додатковий перелік	
Лікарські засоби другої лінії для лікування хіміорезистентного туберкульозу (multidrug-resistant tuberculosis) слід використовувати у спеціалізованих центрах, дотримуючись стандартів ВООЗ щодо контролю туберкульозу.	
[ВООЗ]Амікацин (Amikacin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг; 1 г (у вигляді сульфату).
[ВООЗ]Капреоміцин (Capreomycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату).
[ВООЗ]Канаміцин (Kanamycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) розчин).
[ВООЗ]Левовфлоксацин (Levofloxacin)*	Таблетки: 250 мг; 500 мг; 750 мг.

	* Офлоксацин і моксифлоксацин можуть бути альтернативою при наявності та програмах лікування.
[BOO3] Натрію аміносаліцилат (Sodium aminosalicylate)	Гранули. Таблетки: 500 мг; 1000 мг.
[BOO3] Стрептоміцин (Streptomycin) [сн].	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (у вигляді сульфату) у флаконі.
6.3. Протигрибкові лікарські засоби	
[BOO3] Гризеофульвін (Griseofulvin)	Таблетки: 125 мг.
[BOO3] Клотримазол (Clotrimazole)	Вагінальний гель: 20 мг/г. Вагінальні таблетки: 100 мг; 500 мг.
[BOO3] Ністатин (Nystatin)	Таблетки: 500 000 МО.
[BOO3] Флуконазол (Fluconazole)	Капсули: 50 мг. Розчин для інфузій: 2 мг/мл у флаконі.
Додатковий перелік	
[BOO3] Амфотерицин В (Amphotericin B)	Порошок для приготування розчину для інфузій: 50 мг у флаконі (У вигляді натрію деоксихолату або комплексу з ліпосомами).
[BOO3] Флуцитозин (Flucytosine)	Інфузія: 2,5 г в 250 мл.
6.4. Протівірусні лікарські засоби	
6.4.1. Протигерпесні лікарські засоби	
[BOO3] Ацикловір (Aciclovir)	Порошок для приготування розчину для інфузій: 250 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі. Таблетки: 200 мг.
6.4.2. Антиретровірусні лікарські засоби	
На основі сучасних доказів та досвіду використання, антиретровірусні лікарські засоби наступних трьох класів включені до переліку основних лікарських засобів для лікування та профілактики ВІЛ (профілактика перенесення від матері до дитини, а також профілактика після контакту). ВООЗ підкреслює важливість використання цієї групи лікарських засобів у відповідності до глобальних та національних настанов медичної допомоги. ВООЗ схвалює та рекомендує використовувати фіксовані комбінації, розробляти нові комбінації з фіксованими дозами, включаючи модифіковані лікарські форми, лікарські форми, що не потребують охолодження, та педіатричні лікарські форми належної якості.	

Таблетки з ризикою можуть використовуватися у дітей, тому вони можуть бути включені до номенклатури, за умови наявності препаратів відповідної якості.

6.4.2.1. Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази

[BOO3]Абакавір (Abacavir) (ABC))	Розчин для перорального застосування: 100 мг (у вигляді сульфату) /5 мл. Таблетки: 300 мг (у вигляді сульфату).
[BOO3]Диданозин (Didanosine) (DDI)	Капсули (небуферизовані, вкриті кишковорозчинною оболонкою): 125 мг; 200 мг; 250 мг; 400 мг. Таблетки (буферизовані жувальні, дисперсивні): 100 мг.
[BOO3]Зидовудин (Zidovudine)	Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл. Розчин для приготування в/в інфузій: 10 мг/мл у 20-мл. Таблетки: 300 мг.
[BOO3]Ламівудин (Lamivudine)	Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл. Таблетки: 150 мг.
[BOO3]Ставудин (Stavudine)	Капсули: 30 мг.
[BOO3]Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate)	Таблетки (тенофовіру дизопроксилу фумарат - еквівалентний 245 мг тенофовіру дизопроксилу): 300 мг.

6.4.2.2. Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази

[BOO3]Ефавіренз (Efavirenz) (EFV або EFZ)☑	Капсули: 200 мг. Таблетки: 600 мг. ☑> 3-х років або> 10 кг ваги.
[BOO3]Невірапін (Nevirapine)	Суспензія для перорального застосування: 50 мг/5 мл. Таблетки: 200 мг.

6.4.2.3. Інгібітори протеази

Вибір інгібіторів протеази з Базового переліку повинен визначатися кожною країною після вивчення міжнародних та національних клінічних настанов та досвіду. Ритонавір рекомендований для використання у комбінації у якості фармакологічного стимулятора, а не окремого антиретровірусного засобу.

Решта інгібіторів протеази повинна використовуватися у формі зі стимулятором (наприклад, з ритонавіром).	
[BOO3]Ефавіренц+ Емтрицитабін+Тенофовір (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir)	Таблетки: 600 мг + 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру).
[BOO3]Емтрицитабін+Тенофовір (Emtricitabine + Tenofovir)	Таблетки: 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру).
[BOO3]Індінавір (Indinavir)	Капсули: 400 мг (індінавіру сульфату).
[BOO3]Ламівудин+Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine)	Таблетки: 30 мг + 60 мг[д]; 150 мг + 300 мг.
[BOO3]Лопінавір+Ритонавір (Lopinavir + Ritonavir)	Капсули: 133,3 мг + 33,3 мг. Розчин для перорального застосування: 400 мг + 100 мг/5 мл. Таблетки: 100 мг + 25 мг; 200 мг + 50 мг.
[BOO3]Ритонавір (Ritonavir)	Капсули: 100 мг.
6.4.3. Інші противірусні засоби	
[BOO3]Озельтамівір (Oseltamivir)	Капсули: 30 мг ; 45 мг; 75 мг (фосфату). Порошок для оральної суспензії: 12 мг/мл.
[BOO3]Рибавірин (Ribavirin)	Концентрат для приготування розчину для інфузій: 1 г в 10 мл фосфатного буферного розчину. Таблетки/капсули: 200 мг; 400 мг. Таблетки: 600 мг.
Додатковий перелік	
[BOO3]Пегільований інтерферон альфа (2a або 2b) (Pegylated interferon alpha (2a or 2 b)) *	Флакон або шприц: 80 мкг, 100 мкг (Пегінтерферон альфа-2b). * Для використання в комбінації з рибавірином.
6.5. Засоби для лікування протозойних інфекцій	
6.5.1. Засоби для лікування амебіази та лямбліозу	
[BOO3]Метронідазол (Metronidazole)	Розчин для інфузій: 500 мг в 100 мл у флаконах. Таблетки: 200 мг; 250 мг; 400 мг.

6.5.2. Засоби для лікування лейшманіозу	
[BOO3] Амфотерицин В (Amphotericin B)	Порошок для розчину для ін'єкцій: 50 мг у флаконах (у вигляді дезоксихолату натрію або ліпосомального комплексу).
6.5.3. Засоби для лікування малярії	
6.5.3.1. Для лікування малярії	
Лікарські засоби для лікування інфекції, спричиненої <i>P. falciparum malaria</i> (тропічної малярії), повинні застосовуватись у комбінаціях. Даний перелік рекомендує комбінації згідно рекомендацій лікування. BOO3 визнає, що існують не всі з цих FDC та пропонує їх розвиток та ретельне тестування. Комітет також пропонує розробку та тестування ректальних лікарських форм.	
[BOO3] Доксициклін (Doxycycline)	Капсули: 100 мг (гідрохлориду або хіклату). Таблетки (дисперговані): 100 мг (у вигляді моногідрату).
[BOO3] Мефлохін/Mefloquine	Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду).
6.5.3.2. Для профілактики малярії	
[BOO3] Доксициклін (Doxycycline)☑	Тверді оральні лікарські форми: 100 мг (у вигляді гідрохлориду або хіклату). ☑>8 років.
[BOO3] Мефлохін (Mefloquine)☑	Таблетки: 250 мг (у вигляді гідрохлориду). ☑> 5 кг або> 3 місяців
6.5.4. Засоби для лікування пневмоцистозу та токсоплазмозу	
[BOO3] Сульфаметоксазол+ Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	Ін'єкції: 80 мг + 16 мг/мл в ампулах по 5 мл. Розчин оральний: 200 мг + 40 мг/5 мл[д]. Таблетки: 100 мг + 20 мг; 400 мг + 80 мг[д].
6.5.5. Лікарські засоби для лікування трипаносомозу	
6.5.5.1. Лікарські засоби для лікування африканського трипаносомозу	
6.5.5.2. Лікарські засоби для лікування американського трипаносомозу	
7. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ	
7.1. Для лікування гострого нападу мігрені	
[BOO3] Ібупрофен (Ibuprofen) [д]	Таблетки: 200 мг; 400 мг.
[BOO3] Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	Таблетки: 300 мг; 325 мг; 500 мг.

[BOO3]Парацетамол (Paracetamol)	Розчин оральний: 125 мг/5 мл [д]. Таблетки: 325 мг; 500 мг.
7.2. Для профілактики мігрені	
[BOO3]Пропранолол (Propranolol)	Таблетки: 40 мг (гідрохлорид).
8. ІМУНОСУПРЕСИВНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
8.1. Імуносупресивні лікарські засоби	
<i>Додатковий перелік</i>	
[ДФ] Адалімумаб (Adalimumab)	Розчин для ін'єкцій: 40 мг/0,8 мл.
[BOO3]Азатіоприн (Azathioprine)	Таблетки: 50 мг.
[BOO3]Циклоспорин (Ciclosporin)	Капсули: 25 мг. Концентрат для розчину для ін'єкцій: 50 мг/мл по 1 мл в ампулах.
8.2. Цитотоксичні та ад'ювантні лікарські засоби	
<i>Додатковий перелік</i>	
[BOO3]Алопуринол (Allopurinol) [сн]	Таблетки: 100 мг; 300 мг.
[BOO3]Аспарагіназа (Asparaginase)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 10 000 МО у флаконах.
[BOO3]Блеоміцин (Bleomycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 15 мг (у вигляді сульфату) у флаконах.
[BOO3]Вінбластин (Vinblastine)	Порошок для ін'єкцій: 5 мг (сульфат) у флаконах.
[BOO3]Вінкристин (Vincristine)	Порошок для ін'єкцій: 1 мг (сульфат) у флаконах.
[BOO3]Дакарбазин (Dacarbazine)	Порошок для ін'єкцій: 100 мг у флаконах.
[BOO3]Дактиноміцин (Dactinomycin)	Порошок для ін'єкцій: 500 мкг у флаконах.
[BOO3]Доцетаксел (Docetaxel)	Розчин для інфузій: 20 мг/мл; 40 мг/мл.
[BOO3]Доксорубіцин (Doxorubicin)	Порошок для інфузій: 10 мг; 50 мг (гідрохлорид) у флаконах.

[BOO3]Етопозид (Etoposide)	Капсули: 100 мг. Розчин для ін'єкцій: 20 мг/мл по 5 мл в ампулах.
[BOO3]Іфосфамід (Ifosfamide)	Порошок для ін'єкцій: 1 г; 2 г у флаконах.
[BOO3]Кальцію фолінат (Calcium folinate)	Розчин для ін'єкцій: 3 мг/мл по 10 мл в ампулах. Таблетки: 15 мг.
[BOO3]Карбоплатин (Carboplatin)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг/5 мл; 150 мг/15 мл; 450 мг/45 мл; 600 мг/60 мл.
[ДФ] Кладрибін (Cladribine)	Розчин для ін'єкцій: 0,1% в ампулах, у флаконах. Розчин для ін'єкцій: 2 мг/мл по 5 мл у флаконах.
[BOO3]Месна (Mesna)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл по 4 мл в ампулах.
[BOO3]Метотрексат (Methotrexate)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл (у вигляді солі натрію). Таблетки: 2,5 мг (у вигляді солі натрію).
[ДФ] Нілотиніб (Nilotinib)	Капсули: 150 мг, 200 мг.
[BOO3]Паклітаксел (Paclitaxel)	Концентрат для розчину для інфузій: 6 мг/мл.
[BOO3]Прокарбазин (Procarbazine)	Капсули: 50 мг (у вигляді гідро хлориду).
[BOO3]Фторурацил (Fluorouracil)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл по 5 мл в ампулах.
[BOO3]Хлорамбуцил (Chlorambucil)	Таблетки: 2 мг.
[BOO3]Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	Порошок для розчину для ін'єкцій: 500 мг у флаконах.
[BOO3]Цитарабін (Cytarabine)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл.
8.3. Гормони та антигормони	
<i>Додатковий перелік</i>	
[BOO3]Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі натрію фосфату).
[BOO3]Гідрокортизон (Hydrocortisone)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 100 мг (у вигляді натрію сукцинату) у флаконах.

	Суспензія для ін'єкцій: 2,5% по 2 мл в ампулах.
[BOO3]Метилпреднізолон (Methylprednisolone) <i>[cn]</i>	Порошок для ін'єкцій: 40 мг/мл; 80 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 1 мл у флаконах.
[BOO3]Преднізолон (Prednisolone)	Таблетки: 5 мг.
[BOO3]Тамоксифен (Tamoxifen)	Таблетки: 10 мг (у вигляді цитрату).
9. ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
[BOO3]Леводопа+ Карбідоба (Levodopa + Carbidopa)	Таблетки: 250 мг + 25 мг.
10. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КРОВ	
10.1. Антианемічні лікарські засоби	
[BOO3]Заліза сіль (Ferrous salt)	Таблетки: еквівалентно 100 мг заліза. Капсули: еквівалентно 115 мг елементарного заліза.
[BOO3]Заліза сіль+Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)	Таблетки: еквівалентно 100 мг заліза + 550 мкг фолієвої кислоти.
[BOO3]Фолієва кислота (Folic acid)	Таблетки: 1 мг; 5 мг.
10.2. Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію та гемостатичні засоби	
[BOO3]Варфарин (Warfarin)	Таблетки: 2,5 мг; 3 мг; 5 мг (натрієва сіль).
[BOO3]Гепарин натрій (Heparin sodium)	Розчин для ін'єкцій: 5000 МО/мл по 1 мл в ампулах, флаконах.
[ДФ] Губка гемостатична з амбеном	Суха речовина: 0,8 г.
[ДФ] Ельтромбопаг (Eltrombopag)	Таблетки: 25 мг, 50 мг.
[ДФ] Надропарин кальцію (Nadroparin calcium)	Розчин для ін'єкцій: 9500 МО анти-Ха/мл по 0,3 мл; 0,4 мл; 0,8 мл; 0,6 мл у шприцах.
[BOO3]Протаміну сульфат (Protamine sulfate)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл, 50 мг/мл по 5 мл в ампулах, флаконах.
[BOO3]Транексамова кислота (Tranexamic acid)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл по 5 мл в ампулах.

[BOO3]Фітоменадіон (Phytomenadione)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл по 1 мл в ампулах.
10.3. Інші лікарські засоби, що застосовуються при гемоглобінопатіях	
<i>Додатковий перелік</i>	
[BOO3]Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)	Капсули: 500 мг.
[BOO3]Десферіоксамін (Deferoxamine)	Ліофілізат для розчину для ін'єкцій: 500 мг у флаконах.
11. ПРЕПАРАТИ КРОВІ ТА ПЛАЗМОЗАМІННІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЛЮДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ	
11.1. Кров та її компоненти*	
BOO3 визнає, що досягнення самозабезпеченості, за винятком особливих обставин що перешкоджають цьому, у постачанні безпечних компонентів крові на основі добровільного, безоплатного донорства крові, та безпеки поставки є важливими національними цілями для запобігання нестачі крові та задоволення потреби населення в переливанні. Всі препарати повинні відповідати вимогам BOO3.	
[BOO3] Еритроцити (red blood cells)*	
[BOO3] Концентрат тромбоцитів (platelet concentrates)*	
[BOO3] Свіжозаморожена плазма (Fresh frozen plasma)*	
[BOO3] Цільна кров (whole blood)*	
* – відноситься до засобів категорії «кров та її компоненти», взяття, приготування, зберігання та застосування яких регулюється нормами Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 №239/95-ВР та іншими підзаконними актами України.	
11.2. Лікарські засоби, отримані з плазми	
Всі фракції плазми крові повинні відповідати вимогам Керівництва BOO3 щодо забору, обробки та контролю якості крові, компонентів крові та похідних плазми (Revised 1992). (WHO Technical Report Series, No. 840, 1994, Annex 2).	

11.2.1. Імуноглобуліни людини	
<i>Додатковий перелік</i>	
[BOO3] Імуноглобулін людини нормальний (Human normal immunoglobulin)	Розчин для внутрішньом'язового введення: 16% білковий розчин. * Розчин для внутрішньовенного введення: 5%; 10% білковий розчин. ** *Показаний для первинного імунодефіциту. ** Вимірювання для первинного імунодефіциту і Kawasaki хвороби.
11.2.2. Фактори коагуляції крові	
<i>Додатковий перелік</i>	
[BOO3] Фактор коагуляції VIII (Coagulation Factor VIII)	Порошок для ін'єкцій: 500 МО/флаконах.
[BOO3] Фактор коагуляції IX (Coagulation Factor IX)	Порошок для ін'єкцій: 500 МО/флаконах, 1000 МО/флаконах.
11.3. Плазмозамінні лікарські засоби	
12. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ	
12.1. Антиангінальні лікарські засоби	
[BOO3] Бісопролол (Bisoprolol)	Таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
[BOO3] Верапаміл (Verapamil)	Таблетки: 40 мг; 80 мг (гідрохлорид).
[BOO3] Ізосорбїду динітрат (Isosorbide dinitrate)	Таблетки: (сублінгвальні) 5 мг.
[BOO3] Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	Таблетки: (сублінгвальні) 500 мкг.
12.2. Антиаритмічні лікарські засоби	
[BOO3] Бісопролол (Bisoprolol)	Таблетки: 5 мг; 10 мг.
[BOO3] Верапаміл (Verapamil)	Розчин для ін'єкцій: 2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах. Таблетки: 40 мг; 80 мг.
[BOO3] Дигоксин (Digoxin)	Розчин для ін'єкцій: 250 мкг/мл по 1 мл в ампулах. Таблетки: 250 мкг.

[BOO3]Епінефрин (Epinephrine)	Розчин для ін'єкцій: 1,8 мг/мл по 1 мл в ампулах.
[BOO3]Лідокаїн (Lidocaine)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах.
Додатковий перелік	
[BOO3]Аміодарон (Amiodarone)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл по 3 мл в ампулах (гідрохлорид). Таблетки: 200 мг (гідрохлорид).
12.3. Антигіпертензивні лікарські засоби	
[BOO3]Амлодипін (Amlodipine)	Таблетки: 2,5 мг, 5 мг, 10 мг (у вигляді малеату або бесилату).
[BOO3]Бісопролол (Bisoprolol)	Таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
[ДФ]Валсартан (Valsartan)	Таблетки: 40 мг; 80 мг; 160 мг; 320 мг.
[BOO3]Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	Таблетки: 25 мг; 100 мг.
[BOO3]Еналаприл (Enalapril)	Таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг.
[ДФ]Карведилол (Carvedilol)	Таблетки: 3,125 мг, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг, 50 мг.
[ДФ]Лізиноприл (Lisinopril)	Таблетки: 2,5 мг, 5 мг; 10 мг; 20 мг.
[ДФ]Лозартан (Losartan)	Таблетки: 12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг.
[BOO3]Метилдопа (Methyldopa)	Таблетки: 250 мг.
[ДФ]Небіволол (Nebivolol)	Таблетки: 2,5 мг, 5 мг.
[ДФ]Олмесартан (Olmesartan)	Таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг.
[ДФ]Периндоприл (Perindopril)	Таблетки: 2 мг; 2,5 мг; 4 мг; 5 мг, 8 мг; 10 мг.
[ДФ]Раміприл (Ramipril)	Таблетки: 1,25 мг; 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
[ДФ]Фелодипін (Felodipine)	Таблетки: 2,5 мг, 5 мг, 10 мг.
12.4. Лікарські засоби, що застосовуються при серцевій недостатності	
[BOO3]Бісопролол (Bisoprolol)	Таблетки: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
[BOO3]Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	Таблетки: 25 мг; 100 мг.

[BOO3] Дигоксин (Digoxin)	Розчин для ін'єкцій: 250 мкг/мл по 1 мл в ампулах. Таблетки: 250 мкг.
[BOO3] Еналаприл (Enalapril)	Таблетки 2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг (у вигляді малеата).
[BOO3] Фуросемід (Furosemide)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах. Таблетки: 40 мг.
Додатковий перелік	
[BOO3] Допамін (Dopamin)	Концентрат для приготування розчину для інфузій: 40 мг/мл (гідрохлорид) по 5 мл у флаконах.
12.5. Антитромботичні лікарські засоби	
[BOO3] Ацетисаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)	Таблетки: 100 мг.
[ДФ] Дипіридамо́л (Dipyridamole)	Таблетки: 25 мг, 75 мг.
Додатковий перелік	
[ДФ] Альтеплаза (Alteplase)	Порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій: 50 мг.
[BOO3] Стрептокіназа (Streptokinase)	Порошок для ін'єкцій: 1,5 млн МО у флаконах.
12.6. Гіполіпідемічні лікарські засоби	
[ДФ] Аторвастатин (Atorvastatin)	Таблетки: 10 мг, 20 мг, 40 мг, 80 мг.
[ДФ] Розувастатин (Rosuvastatin)	Таблетки: 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг.
[BOO3] Симвастатин (Simvastatin)	Таблетки: 10 мг; 20 мг; 40 мг.
13. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДЕРМАТОЛОГІЇ (МІСЦЕВІ)	
13.1. Протигрибкові лікарські засоби	
[ДФ] Біфоназол (Bifonazole)	Гель: 1%. Крем: 1%.

[ДФ] Еконазол (Econazole)	Гель: 10мг/г. Крем: 1%.
[ВООЗ] Міконазол (Miconazole)	Крем: (нітрат) 2%.
[ДФ] Метиленовий синій (Methylthioninium chloride)	Розчин для зовнішнього застосування спиртовий: 10 мг/мл.
[ДФ] Ністатин (Nystatin)	Мазь: 100 000 ОД/г.
[ВООЗ] Тербінафін (Terbinafine)	Крем: 1% тербінафіну гідрохлорид.
13.2. Протимікробні лікарські засоби	
[ДФ] Декаметоксин (Decamethoxin)	Розчин для зовнішнього застосування спиртовий: 0,1%. Розчин для зовнішнього застосування: 0,03%.
[ДФ] Діамантовий зелений (Viride nitens)	Розчин для зовнішнього застосування спиртовий: 1%.
[ДФ] Йод (Iodine)	Розчин для зовнішнього застосування спиртовий: 5%.
[ДФ] Ізотретиноїн + Еритроміцин (Isotretinoin + Erythromycin)	Гель: 0,5мг/20мг/г.
[ДФ] Ізотретиноїн (Isotretinoin)	Капсули: 8 мг, 10 мг, 16 мг, 20 мг.
[ВООЗ] Калію перманганат (Potassium permanganate)	Порошок для розчину для зовнішнього застосування: 3 г; 5 г.
[ДФ] Кислота борна (Boric acid)	Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий: 3%. Порошок для зовнішнього застосування.
[ДФ] Кислота фузидова (Fusidic acid)	Мазь: 20 мг/г. Крем: 20 мг/г. Гель: 2 % (20 мг/г).
[ДФ] Метронідазол (Metronidasole)	Гель для зовнішнього застосування: 10 мг/г.
[ДФ] Мірамістин (Miramistin)	Мазь: 5 мг/г. Розчин для зовнішнього застосування: 0,1%.

[BOO3] Мупіроцин (Mupirocin)	Крем: (у вигляді мупіроцину кальцію): 2%. Мазь: 2%.
[ДФ] Неоміцину сульфат + Бацитрацин цинку (Neomycin sulphate + Bacitacin Zink)	Мазь: 1%.
[ДФ] Перекис водню (Hydrogen peroxide)	Розчин для зовнішнього застосування: 3%.
[BOO3] Срібла сульфадіазин (Silver sulfadiazine)☑	Крем: 1%. ☑ > 2 місяці.
[ДФ] Сульфаніламід (Sulfanilamide)	Лінімент: 5%. Мазь: 10%.
[ДФ] Сульфатіазол (Sulfathiazole)	Крем: 2%.
[ДФ] Тетрациклін (Tetracyclin)	Мазь: 3 %.
[ДФ] Хлорамфенікол + Метилурацил (Chloramphenicol + Methyluracil)	Мазь: 7,5мг/40мг/г.
[ДФ] Цинку оксид (Zinc oxide)	Порошок: 0,1г/г. Мазь: 10%.
13.3. Протизапальні засоби та засоби проти свербіжу	
[BOO3] Бетаметазон (Betamethasone)☑	Крем: 0,1% (у вигляді валерату). Мазь: 0,1% (у вигляді валерату). ☑ У новонароджених краще застосовувати гидрокортизон.
[BOO3] Гідрокортизон (Hydrocortisone)	Крем: 1% (ацетат). Мазь: 1% (ацетат).
[ДФ] Мометазон (Mometasone)	Мазь: 0,1%. Крем: 0,1%. Лосьйон: 0,1%.
13.4. Лікарські засоби, що впливають диференціацію і проліферацію клітин шкіри	
[BOO3] Бензоїлу пероксид (Benzoyl peroxide)	Лосьйон: 5%.

[BOO3] Саліцилова кислота (Salicylic acid)	Розчин: 1 %. Мазь: 2%; 5%; 10%.
[ДФ] Уstekinumab (Ustekinumab)	Розчин для ін'єкцій: 90 мг/мл по 1 мл.
13.5. Засоби для лікування педикульозу та корости	
[BOO3] Бензилбензоат (Benzyl benzoate) ☒	Емульсія: 20%. Крем: 250 мг/г. Мазь: 200 мг/г; 250 мг/г. ☒ > 2-х років.
[BOO3] Перметрин (Permethrin)	Крем-шампунь: 1 %.
13.6. Інші лікарські засоби	
[ДФ] Адапален (Adapalene)	Гель: 0,1%.
[ДФ] Вазелін (Vaseline)	Мазь.
[ДФ] Гліцерин (Glycerol)	Розчин для зовнішнього застосування: 85%.
[ДФ] Гепариноід (Heparinoid)	Мазь: 100 ОД/мг.
[ДФ] Кислота азелаїнова (Azelaic acid)	Гель для зовнішнього застосування: 15%. Крем: 20%.
[ДФ] Подофілотоксин (Podophyllotoxin)	Крем: 1,5 мг/г.
14. ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ	
14.1. Офтальмологічні лікарські засоби	
[BOO3] Тропікамід (Tropicamide)	Краплі очні: 0,5%; 1%.
14.2. Рентгенконтрастні засоби	
[BOO3] Барію сульфат (Barium sulfate)	Порошок для приготування суспензії.
[BOO3] Йогексол (Iohexol)	Розчин для ін'єкцій: 240 мг йоду/мл по 10 мл; 240 мг йоду/мл по 20 мл; 240 мг йоду/мл по 50 мл; 240 мг йоду/мл по 100 мл; 300 мг йоду/мл по 10 мл; 300 мг йоду/мл по 20 мл; 300 мг йоду/мл по 50 мл;

	300 мг йоду/мл по 100 мл; 300 мг йоду/мл по 200 мл; 350 мг йоду/мл по 20 мл; 350 мг йоду/мл по 50 мл; 350 мг йоду/мл по 100 мл; 350 мг йоду/мл по 200 мл; 350 мг йоду/мл по 500 мл в ампулах.
Додатковий перелік	
[BOO3] Барію сульфат (Barium sulfate) [cn]	Порошок для приготування суспензії.
15. ДЕЗИНФІКУЮЧІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ	
15.1. Антисептичні засоби	
[BOO3] Етанол (Ethanol)	Розчин: 70% (денатурований).
[BOO3] Повідон-йод (Povidone-iodine)	Розчин: 10% (що еквівалентно 1% активному йоду).
[BOO3] Хлоргексидин (Chlorhexidine)	Розчин: 0,05% (диглюконат).
15.2. Дезинфікуючі засоби	
16. ДІУРЕТИКИ	
[BOO3] Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	Таблетки: 25 мг; 100 мг.
[ДФ] Індапамід (Indapamide)	Капсули, таблетки: 1,5 мг, 2,5 мг.
[BOO3] Манітол (Mannitol)	Розчин для інфузій: 10%; 15%; 20%.
[BOO3] Спіронолактон (Spironolactone)	Таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг.
[ДФ] Торасемід (Torasemide)	Розчин для ін'єкцій: 10мг/ 2мл; 20мг/ 4мл. Розчин для інфузій: 200мг/20мл. Таблетки: 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг, 50 мг, 100 мг, 200 мг.
[BOO3] Фуросемід (Furosemide)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах. Таблетки: 40 мг.
17. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ	
Додатковий перелік [cn]	
[BOO3] Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	

17.1. Противиразкові лікарські засоби	
[ДФ] Вісмуту субцитрат (Bismuth subcitrate)	Тверді оральні лікарські форми: 120 мг.
[ДФ] Езомепразол (Esomeprazole)	Таблетки: 20 мг; 40 мг. Ліофілізат для розчину для ін'єкцій: 40 мг. Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій: 40 мг.
[ДФ] Лансопразол (Lansoprazole)	Капсули: 15 мг; 30 мг.
[ВООЗ] Омепразол (Omeprazole)	Порошок для орального розчину: 20 мг саше. Тверді оральні лікарські форми: 10 мг; 20 мг; 40 мг.
[ДФ] Пантопразол (Pantoprazole)	Таблетки: 20 мг; 40 мг. Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 40 мг у флаконах.
[ДФ] Рабепразол (Rabeprazole)	Тверді оральні лікарські форми: 10 мг; 20 мг. Ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 20 мг.
[ВООЗ] Ранітидин (Ranitidine)	Розчин для ін'єкцій: 25 мг/мл (гідрохлорид) в 2-мл ампулі. Таблетки: 150 мг (гідрохлорид).
17.2. Протиблювотні лікарські засоби	
[ВООЗ] Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл в 1-мл ампулі (у вигляді динатрієвої солі фосфату). Тверді оральні лікарські форми: 0,5 мг; 4 мг.
[ДФ] Домперидон (Domperidone)	Таблетки: 10 мг; 30 мг. Суспензія оральна: 1мг/мл.
[ДФ] Ітоприду гідрохлорид (Itopride hydrochloride)	Таблетки: 50 мг.
[ВООЗ] Метоклопрамід (Metoclopramide)☑	Розчин для ін'єкцій: 5 мг (гідрохлорид)/мл в 2-мл ампулах. Таблетки: 10 мг (гідрохлорид). ☑Не для новонароджених.

[BOO3] Ондансетрон (Ondansetron☑)	Розчин для ін'єкцій: 2 мг основи/мл в 2-мл ампулі (гідрохлорид). Тверді оральні лікарські форми: еквівалентно 4 мг основи; еквівалентно 8 мг основи. ☑ > 1 місяць.
17.3. Протизапальні лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника	
[ДФ] Месалазин (Mesalazine)	Тверді оральні лікарські форми: 400 мг; 500 мг; 800 мг; 1000 мг; 2000 мг. Супозиторії ректальні: 250 мг; 500 мг; 1000 мг.
[BOO3] Сульфасалазин (Sulfasalazine)	Таблетки: 500 мг.
17.4. Проносні лікарські засоби	
[ДФ] Натрію пікосульфат (Sodium picosulfate)	Тверді оральні лікарські форми: 5 мг; 7,5 мг. Краплі оральні: 7,5 мг/мл у флаконах.
[BOO3] Сена (Senna)	Таблетки: 70 мг (сеннозиди).
17.5. Лікарські засоби, які застосовуються при діарейі	
17.5.1. Для пероральної регідrataції	
17.5.2. Лікарські засоби від діарейі у дітей	
17.5.3. Антидіарейні лікарські засоби	
[ДФ] Лоперамід (Loperamide)	Тверді оральні лікарські форми: 2 мг.
17.6. Спазмолітичні лікарські засоби, що застосовуються при шлунково-кишкових захворюваннях	
[ДФ] Дротаверин (Drotaverine)	Таблетки: 40 мг; 80 мг. Розчин для ін'єкцій: 20 мг/мл в ампулах.
[ДФ] Мебеверин (Mebeverine)	Тверді оральні лікарські форми: 135 мг; 200 мг.
[ДФ] Отилонію бромід (Otilonium bromide)	Таблетки: 40 мг.
18. ГОРМОНИ, ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА КОНТРАЦЕПТИВИ	
18.1. Кортикостероїди та синтетичні замінники	
[ДФ] Бетаметазон (Betamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл по 1мл в ампулах. Суспензія для ін'єкцій: 2мг/5мг/1мл; 6,43мг/2,63мг/1мл по 1мл ампулах.

[BOO3] Гідрокортизон (Hydrocortisone)	Таблетки: 10 мг; 20 мг.
[ДФ] Преднізон (Prednisone)	Супозиторії ректальні: 100 мг.
[ДФ] Тріамцінолон (Triamcinolone)	Таблетки: 4 мг. Суспензія для ін'єкцій: 40 мг/1 мл по 1 мл в ампулах.
[BOO3] Флудрокортизон (Fludrocortisone)	Таблетки: 100 мкг (ацетат).
18.2. Андрогени	
<i>Додатковий перелік</i>	
[BOO3] Тестостерон (Testosterone)	Розчин для ін'єкцій: 250 мг/мл по 4 мл; 250 мг/мл по 1 мл; 1% по 1 мл; 5% по 1 мл.
18.3. Контрацептиви	
18.3.1. Оральні гормональні контрацептиви	
[BOO3] Етинілестрадіол + Левоноргестрел (Етинілестрадіол + Levonorgestrel)	Таблетки: 0,03 мг/0,15 мг, 0,03 мг/0,125 мг.
[BOO3] Левоноргестрел (Levonorgestrel)	Таблетки: 1,5 мг; 0,75 мг.
18.3.2. Ін'єкційні гормональні контрацептиви	
[BOO3] Медроксипрогестерон (Medroxyprogesterone)	Суспензія для ін'єкцій: у флаконах, у заповнених шприцах 150 мг/мл.
18.3.3. Внутрішньоматкові засоби	
18.3.4. Засоби бар'єрної контрацепції	
18.3.5. Контрацептивні імплантанти	
18.4. Естрогени (Estrogens)	
18.5. Інсуліни та інші лікарські засоби, що застосовуються для лікування діабету	
[BOO3] Гліклазид (Gliclazide)* 	Тверді оральні лікарські форми: (Таблетки з контрольованим вивільненням) 30 мг, 60 мг; 80 мг. * Глібенкламід не підходить пацієнтам старше 60 років.
[ДФ] Гліквідон (Gliquidone)	Таблетки: 30 мг.

[ДФ] Глімепірид (Glimepiride)	Таблетки: 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг.
[ВООЗ] Глюкагон (Glucagon)	Ліофілізат для розчину для ін'єкцій: по 1 мг (1 МО) у флаконах 1 мл.
[ДФ] Ізодибут (Isodibut)	Таблетки: 0,5 г.
[ВООЗ] Ін'єкційний інсулін (розчинний) (Insulin injection (soluble))	Розчин для ін'єкцій: 40 ОД/мл; 100 ОД/мл в 10-мл флаконі.
[ВООЗ] Інсулін середньої тривалості дії (Intermediate-acting insulin)	Розчин для ін'єкцій: 40 ОД/мл в 10-мл флаконі (з'єднання інсуліну суспензії цинку або ізофан інсуліну).
[ВООЗ] Метформін (Metformin)	Таблетки: 500 мг (гідрохлорид).
[ДФ] Піоглітазон (Pioglitazone)	Таблетки: 15 мг, 30 мг, 45 мг.
[ДФ] Репаглінід (Repaglinide)	Таблетки: 1 мг, 2 мг.
[ДФ] Саксагліптин (Saxagliptin)	Таблетки: 2,5 мг, 5 мг.
[ДФ] Ситагліптин (Sitagliptin)	Таблетки: 25 мг, 50 мг, 100 мг.
18.6. Індуктори овуляції	
<i>Додатковий перелік</i>	
[ВООЗ] Кломіфен (Clomifene)	Таблетки: 50 мг (цитрат).
18.7. Прогестогени	
[ДФ] Прогестерон (Progesterone)	Капсули: 100 мг; 200 мг. Розчин для ін'єкцій олійний: 1%; 2,5% по 1 мл в ампулах.
18.8. Гормони щитовидної залози і антитиреоїдні лікарські засоби	
[ВООЗ] Левотироксин (Levothyroxine)	Таблетки: 25 мкг[д]; 50 мкг; 100 мкг (натрієва сіль).
[ДФ] Тиротропін альфа (Thyrotropine alfa)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 0,9 мг/мл по 1,1мг у флаконах.
[ДФ] Тіамазол (Thiamazole)	Таблетки: 5 мг, 10 мг.
18.9. Препарати гормонів гіпофіза	
[ДФ] Десмопресин (Desmopressin)	Краплі назальні: 0,1 мг/мл по 2,5мл. Спрей назальний: 10 мкг/дозу по 50 доз (5мл).

	Таблетки: 0,1 мг, 0,2 мг. Ліофілізат оральний: 60 мкг, 120 мкг, 240 мкг.
[ДФ] Карбетоцин (Carbetocin)	Розчин для ін'єкцій: 100 мкг/мл по 1 мл в ампулах.
[ДФ] Соматропін (Somatropine)	Ліофілізат для розчину для ін'єкцій: 16 МО (5,3мг) у флаконах. Розчин для ін'єкцій: 8 МО/мл по 0,5мл, 2мл у флаконах. Порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій: 4 МО (1,33мг), 10 МО (3,33мг), 16 МО (5,3мг) у флаконах. Розчин для ін'єкцій: 10 мг/1,5мл по 1,5 мл у шприці-ручці. Розчин для ін'єкцій: 5 мг/1,5 мл по 1,5 мл у картриджах. Розчин для ін'єкцій: 10 мг/1,5 мл по 1,5 мл у картриджах.
18.10. Препарати гормонів гіпоталамуса	
[ДФ] Ланреотид (Lanreotid)	Порошок ліофілізований для приготування суспензії для ін'єкцій пролонгованої дії: 30 мг у флаконах.
[ДФ] Октреотид (Octreotide)	Розчин для ін'єкцій: 0,05 мг/мл, 0,1 мг/мл по 1 мл в ампулах. Мікросфери для приготування суспензії для ін'єкцій: 10 мг, 20 мг, 30 мг.
Додатковий перелік перелік [Д]	
[ВООЗ] Калію йодид (Potassium iodide)	Таблетки: 100 мкг; 200 мкг; 1 мг; 250 мг.
19. ІМУНОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
19.1. Діагностичні засоби	
Всі туберкуліни повинні відповідати вимогам ВООЗ для туберкуліну (переглянутий 1985).	
[ВООЗ] Туберкулін, Туберкулінові проби (Tuberculin)	Розчин для ін'єкцій.

19.2 Сироватки і імуноглобуліни

Всі фракції плазми крові повинні відповідати вимогам ВООЗ до збору, обробці і контролю якості крові, компонентів крові і похідних плазми (переглянутий 1992). Комітет експертів ВООЗ з стандартизації біологічних препаратів. Сорок третя доповідь. (ВООЗ Серія технічних доповідей, Кіл. 840, 1994, Додаток 2).

[ВООЗ] Анти-D імуноглобулін (людини) (anti-D immunoglobulin (human))	Розчин для ін'єкцій: 300 мкг в ампулах. Розчин для ін'єкцій: 1 мл містить неповні резус-антитіла анти-Rho (D) - 0,09-0,11 г, в ампулах.
[ВООЗ] Антитоксин дифтерії (Diphtheria antitoxin)	Розчин для ін'єкцій: по 10 000 МО в ампулах.
[ВООЗ] Імуноглобулін антирабічний (Rabies immunoglobulin)	Розчин для ін'єкцій: 75 МО в ампулах.
[ВООЗ] Протиправцевий імуноглобулін (людини) (Antitetanus immunoglobulin (human))	Розчин для ін'єкцій: 250 МО (1 доза) в ампулах.

19.3. Вакцини

Нижченаведений перелік визначає вакцини, для яких існують рекомендації Стратегічної Дорадчої Групи експертів з імунізації (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)) та/або меморандум ВООЗ (<http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/index.html>). Цей сайт буде оновлюватися по мірі публікації нових меморандумів і містить найновішу інформацію та рекомендації.

ВООЗ звертає увагу на необхідність використання у дітей полівалентних вакцин.

[ВООЗ] Вакцина БЦЖ (BCG vaccine)	
[ВООЗ] Вакцина проти гемофільної інфекції типу b (Haemophilus influenzae type b vaccine)	
[ВООЗ] Вакцина проти гепатиту А (Hepatitis A vaccine)	
[ВООЗ] Вакцина проти гепатиту В (Hepatitis B vaccine)	

[BOO3]Вакцина проти гриппу (Influenza vaccine)	
[BOO3]Вакцина проти кору (Measles vaccine)	
[BOO3]Вакцина проти епідемічного паротиту (Mumps vaccine)	
[BOO3]Вакцина проти кашлюку (Pertussis vaccine)	
[BOO3]Вакцина проти поліомієліту (Poliomyelitis vaccine)	
[BOO3]Вакцина проти сказу (Rabies vaccine)	
[BOO3]Вакцина проти краснухи (Rubella vaccine)	
[BOO3]Вакцина проти черевного тифу (Typhoid vaccine)	
[BOO3]Вакцина проти вітряної віспи (Varicella vaccine)	
[BOO3]Вакцина проти жовтої лихоманки (Yellow fever vaccine)	
[BOO3] Дифтерійний анатоксин (Diphtheria toxoid)	
[BOO3]Менінгококова вакцина проти менінгіту (Meningococcal meningitis vaccine)	
[BOO3]Пневмококова вакцина (Pneumococcal vaccine)	
[BOO3] Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	

20. МІОРЕЛАКСАНТИ ТА ІНГІБІТОРИ ХОЛІНЕСТЕРАЗИ	
20.1. Міорелаксанти (периферичної дії) та інгібітори холінестерази	
[BOO3] Атракурій (Atracurium)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл (безилат).
[BOO3] Неостигмін (Neostigmine)	Розчин для ін'єкцій: 500 мкг по 1 мл ампулах.
[ДФ] Піпекуронію бромід (Pipcuronium bromide)	Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій: 4 мг.
[BOO3] Піридостигмін (Pyridostigmine)	Таблетки: 60 мг (бромід).
[ДФ] Рокуронію бромід (Rocuronium bromide)	Розчин для внутрішньовенного введення: 10 мг/мл у флаконах.
[BOO3] Суксаметоній (Suxamethonium)	Розчин для ін'єкцій: 20 мг/мл.
20.2. Міорелаксанти з центральним механізмом дії	
[ДФ] Баклофен (Baclofen)	Таблетки: 10 мг, 25 мг.
21. ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
21.1. Антибактеріальні лікарські засоби	
[BOO3] Ацикловір (Acyclovir)	Мазь: 3%.
[BOO3] Тетрациклін (Tetracycline)	Очна мазь: 1% (гідрохлорид).
21.2. Протизапальні лікарські засоби	
21.3. Місцеві анестетики	
21.4. Міотичні і протиглаукомні лікарські засоби	
[BOO3] Ацетазоламід (Acetazolamide)	Таблетки: 250 мг.
[BOO3] Латанопрост (Latanoprost)	Краплі очні: 50 мкг/мл.
[BOO3] Пілокарпін (Pilocarpine)	Розчин (очні краплі): 10 мг/мл по 5 мл; 10 мг/мл по 10 мл.
[BOO3] Тимолол (Timolol)	Розчин (очні краплі): 0,25; 0,5% (у формі малеату).
21.5. Мідріатичні лікарські засоби	
[BOO3] Атропін (Atropine) * ☒	Розчин (очні краплі): 1% (сульфат) * [д] ☒ > 3 місяці.

21.6. Антифактор росту ендотелію судин	
<i>Додатковий перелік</i>	
[BOO3] Бевацизумаб (Bevacizumab)	Ін'єкція: 25 мг/мл.
22. ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ТА ЗНИЖУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МІОМЕТРІЮ	
22.1. Засоби, які підвищують скоротливу активність міометрію	
[ДФ] Динопрост (Dinoprost)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг/1 мл по 1мл в ампулах.
[BOO3] Мізопростол (Misoprostol)	Таблетки: 200 мкг.
[BOO3] Окситоцин (Oxytocin)	Розчин для ін'єкцій: 5 МО/мл по 1 мл.
22.2. Засоби, які знижують скоротливу активність міометрію (токолітики)	
[ДФ] Гексопреналін (Hexoprenaline)	Розчин для ін'єкцій: 10 мкг/ 2мл по 2 мл. Таблетки: 0,5 мг. Концентрат для приготування розчину для інфузій: 25 мкг/5мл.
[BOO3] Ніфедипін (Nifedipine)	Таблетки: 10 мг.
23. РОЗЧИНИ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ	
<i>Додатковий перелік</i>	
[BOO3] Перитонеальний діаліз (відповідного складу) (Intraperitoneal dialysis solution (of appropriate composition))	Парентеральний розчин.
24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПСИХІЧНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ	
24.1. Лікарські засоби, що застосовуються при психотичних розладах	
[BOO3] Галоперидол (Haloperidol) [Д]	Розчин для ін'єкцій: 5 мг в 1 мл ампулах. Таблетки: 5 мг.
[BOO3] Рисперидон (Risperidone)	Тверді оральні лікарські форми: 0,25 мг – 6 мг.
[BOO3] Флуфеназин (Fluphenazine)	Розчин для ін'єкцій: 25 мг (деканоат) в 1 мл ампулах.

[BOO3]Хлорпромазин (Chlorpromazine) [Д]	Розчин для ін'єкцій: 25 мг (гідрохлорид)/мл в 2-мл ампулі. Таблетки: 100 мг (гідрохлорид).
Додатковий перелік	
[BOO3]Клозапін(Clozapine)	Тверді оральні лікарські форми: 25 – 100 мг.
24.2. Лікарські засоби, що застосовуються при порушеннях настрою	
24.2.1. Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах	
[BOO3]Амітриптилін (Amitriptyline)	Таблетки: 25 мг (гідрохлорид).
[BOO3]Флуоксетин (Fluoxetine)	Тверді оральні лікарські форми: 20 мг (як гідрохлорид).
Додатковий перелік [сн]	
[BOO3]Флуоксетин (Fluoxetine)☑	Тверді оральні лікарські форми: 20 мг (як гідрохлорид). ☑ > 8 років.
24.2.2. Лікарські засоби, що застосовуються при біполярних розладах	
[BOO3]Карбамазепін (Carbamazepin)	Таблетки: 200 мг.
[BOO3]Літій (Lithium)	Тверді оральні лікарські форми: 300 мг.
[BOO3]Вальпроєва кислота /Вальпроат натрію (Valproic acid /Sodium valproate)	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії: 300 мг; 500 мг (натрію вальпроат). Капсули: 300 мг, 500 мг.
24.3. Лікарські засоби при тривожних розладах	
[BOO3]Діазепам (Diazepam)	Таблетки з рискою: 5 мг.
24.4. Лікарські засоби, що застосовуються при obsесивно- компульсивних розладах	
[BOO3]Кломіпрамін (Clomipramine)	Таблетки: 25 мг.
24.5. Лікарські засоби для лікування розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин	
[BOO3]Нікотинова замісна терапія (НЗТ) (Nicotine replacement therapy (NRT))	Жувальна гумка: 2 мг; 4 мг (як полакрілекс). Трансдермальний пластр: 10 мг/16 годин; 15 мг/16 годин; 25 мг/16 годин; 7 мг/24 годин; 14мг/24 годин; 21 мг/24 годин.

Додатковий перелік	
[BOO3] Метадон (Methadone)*	Оральна рідина: 5 мг/5 мл (гідрохлорид). * повинен бути використаний тільки в межах програми підтримки.
25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ	
25.1. Антиастматичні засоби і лікарські засоби для лікування хронічної обструктивної хвороби	
[BOO3] Беклометазон (Beclometasone)	Інгаляція (аерозоль): 50 мкг; 100 мкг (дипропіонат) на дозу (у вигляді форм, що не містять фреон); 250 мкг на дозу (у вигляді форм, що не містять фреон).
[BOO3] Будесонід (Budesonide)	Інгаляція (аерозоль) або порошок для інгаляцій: 100 мкг на дозу; 200 мкг на дозу. Інгаляція під тиском: 50 мкг; 200 мкг. Суспензія для розпилення: 0,25 мг/мл; 0,50 мг/мл.
[ДФ] Доксофілін (Doxofylline)	Таблетки: 400 мг. Сироп: 100 мг/5 мл.
[BOO3] Епінефрин/Адреналін (Epinephrine /Adrenaline)	Розчин для ін'єкцій: 1,8 мг/мл по 1 мл в ампулах.
[ДФ] Індакатерол (Indacaterol)	Інгаляція (порошок): 150 мкг; 300 мкг.
[BOO3] Іпратропію бромід (Ipratropium bromide)	Інгаляція (аерозоль): 40 мкг на дозу.
[ДФ] Монтелукаст (Montelukast)	Таблетки жувальні: 5 мг; 4 мг. Таблетки 10 мг.
[ДФ] Омалізумаб (Omalizumab)	Порошок для розчину для ін'єкцій: 75 мг; 150 мг.
[ДФ] Орципреналін (Orciprenaline)	Інгаліції (аерозоль): 750 мкг.
[ДФ] Рофлуміласт (Roflumilast)	Таблетки: 500 мкг.
[BOO3] Сальбутамол (Salbutamol)	Інгаляція (аерозоль): сальбутамол 100 мкг (1 доза).
[ДФ] Сальметереол (Salmeterol)	Інгаляція (аерозоль); суспензія: 25 мкг.
[ДФ] Тіотропію бромід	Інгаляція (порошок): 18 мкг.

(Tiotropium bromide)	Розчин для інгаляцій: 2,5 мкг.
[ДФ] Теофілін (Theophylline)	Розчин для ін'єкцій: 20 мг/мл. Таблетки пролонгованої дії: 100 мг; 300 мг; 400 мг; 600 мг. Капсули пролонгованої дії: 200 мг, 350 мг.
[ДФ] Флютиказон (Fluticasone)	Інгаляція (аерозоль): 50 мкг, 125 мкг; 250 мкг. Суспензія для інгаляцій: 2 мг/2 мл; 0,5 мг/2 мл. Порошок для інгаляцій: 125 мкг; 250 мкг.
[ДФ] Фенотерол (Fenoterol)	Інгаляції (аерозоль): 100 мкг; 200 мкг.
[ДФ] Формотерол (Formoterol)	Інгаляція (порошок): 12 мкг.
26. РОЗЧИНИ ДЛЯ КОРЕЦІЇ ВОДНОГО, ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ТА КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО БАЛАНСУ, КРОВОЗАМІННИКИ, ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ	
26.1.Оральні лікарські засоби	
[ВООЗ] Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)	
26.2. Парентеральні лікарські засоби	
[ВООЗ] Глюкоза (Glucose)	Розчин для ін'єкцій: 5% (ізотонічний). Розчин для ін'єкцій: 10% (гіпертонічний).
[ВООЗ] Калію хлорид (Potassium chloride)	Розчин для розведення: 7,5% (еквівалентно K^+ 1 ммоль/мл та Cl^- 1 ммоль/мл).
[ДФ] Кальцію хлорид (Calcii chloride)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл у ампулах.
[ВООЗ] Натрію хлорид (Sodium chloride)	Розчин для ін'єкцій: 0,9% ізотонічний (еквівалентно Na^+ 154 ммоль/л, Cl^- 154 ммоль/л).
[ВООЗ] Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	Розчин для інфузій: 8,4% в 100 мл; в 50 мл у пляшках.
[ВООЗ] [ДФ] Розчини електролітів	Розчини.
26.3. Змішані	
[ВООЗ] Вода для ін'єкцій (Water for injection)	Розчин для ін'єкцій: 2-мл; 5-мл; 10-мл ампулах.

26.4. Кровозамінники та перфузійні розчини	
[ДФ] Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	Розчин: 6%, 10%.
[ДФ] Декстран-40 (Dextran-40)	Розчин: 10г/0,9г/ в 100 мл.
[ДФ] Желатин сукцинільований + Натрію хлорид (Gelatine succinate + Sodium chloride) ^[П]	Розчин для інфузій: 40г/7,01г/ в 1000 мл.
[ДФ] Полівінілпіролідон низькомолекулярний (м.м.8000 ± 2000)	Розчин: 6,0г/0,55г/0,042г/0,05г/0,0005г/0,023г/100мл.
[ДФ] Розчин альбуміну людини (Solutio albumini humanum)	Розчин: 5%, 10%, 20%.
26.5. Розчини для парентерального живлення та жирові емульсії	
[ДФ] Олія соєва (Soybean oil)	Емульсія для інфузій: 10%, 20% у флаконах.
[ДФ] Розчини амінокислот	Розчини.
27. ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ	
[ДФ] Альфакальцидол (Alfacalcidol)	Капсули: 0,25 мкг; 0,5 мкг, 1 мкг.
[ВООЗ] Аскорбінова кислота (Ascorbic acid)	Таблетки: 50 мг.
[ВООЗ] Ергокальциферол (Ergocalciferol)	Розчин оральний, олійний у флаконах: 1,25 мг/мл по 10 мл.
[ВООЗ] Кальцій (Calcium)	Таблетки: 500 мг.
[ДФ] Кальцію гліцерофосфат (Calcium glycerophosphate)	Таблетки: 200 мг.
[ВООЗ] Ретинол (Retinol)	Капсули: 100 000 ОД (у вигляді пальмітату). Оральний олійний розчин: 100 000 ОД (як пальмітат)/мл в мультидозованому дозаторі.
Додатковий перелік	
[ВООЗ] Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл в 10-мл ампулі.
28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУХА, ГОРЛА ТА НОСА	

28.1. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа у дітей[д]	
Необхідно переглянути роль антагоністів лейкотрієну при лікуванні алергічних ринітів у дітей.	
[BOO3] Будесонід (Budesonide)	Спрей назальний дозований, суспензія: 50 мкг/доза.
[BOO3] Ксилометазолін (Xylometazoline)☑	Назальний спрей: 0,05%. ☑ Не для дітей віком до 3 місяців.
[BOO3] Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	Краплі очні/вушні: 0,3% краплі (гідрохлорид).
28.2. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа у дорослих	
[ДФ] Азеластин (Azelastine)	Спрей назальний: 1 мг/мл.
[ДФ] Гексетидин (Hexetidine)	Спрей для ротової порожнини: 0,2%. Розчин для ротової порожнини: 0,1%.
[ДФ] Декаметоксин (Decamethoxin)	Краплі вушні: 0,5 мг/мл.
[ДФ] Лоратадин (Loratadine)	Гель назальний: 0,5%.
[ДФ] Мірамістин (Myramistin)	Краплі очні/вушні/для носа розчин: 0,01 %.
[ДФ] Мометазон (Mometasone)	Спрей назальний: 50мкг/дозу.
[ДФ] Оксиметазолін (Oxymetazoline)	Спрей назальний: 0,05%. Краплі назальні: 0,01%, 0,05%.
[ДФ] Офлоксацин (Ofloxacin)	Краплі очні/вушні: 0,3%.
[ДФ] Рифаміцин (Rifamycin)	Краплі вушні: 26мг/мл.
[ДФ] Фенілефрин (Phenylephrine)	Краплі назальні: 0,125%. Спрей назальний: 0,25%.
[ДФ] Фенол (Phenol)	Спрей оральний: 1,4%. Розчин: 1,4 %.
[ДФ] Флутиказон (Fluticasone)	Спрей назальний: 50мкг/дозу по 120 доз, 150 доз.
[ДФ] Фузафунгін (Fusafungine)	Оромукозний та назальний спрей: 50 мг/10 мл по 10 мл у контейнері під тиском.

29. СПЕЦІАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМИ	
29.1. Лікарські засоби, що призначаються немовлятам [д]	
<i>Додатковий перелік</i>	
[BOO3]Ібупрофен (Ibuprofen)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг/мл.
[BOO3]Легеневі сурфактанти (Surfactant)	Суспензія для введення в трахею: 25 мг/мл; 80 мг/мл.
29.2. Лікарські засоби, що призначаються матерям новонароджених	
[BOO3]Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин для ін'єкцій: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах (у вигляді солі натрію фосфату).
30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СУГЛОБІВ	
30.1. Лікарські засоби для лікування подагри	
[BOO3]Алопуринол (Allopurinol)	Таблетки: 100 мг.
30.2. Модифікуючі лікарські засоби, що використовуються при ревматичних хворобах (DMARDs)	
[BOO3]Хлорохін (Chloroquine)	Таблетки: 250 мг (у вигляді фосфату).
<i>Додатковий перелік</i>	
[BOO3]Азатіоприн (Azathioprine)	Таблетки: 50 мг.
[BOO3]Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine)	Таблетки: 200 мг (у вигляді сульфату).
[BOO3]Метотрексат (Methotrexate)	Таблетки: 2,5 мг (у вигляді натрієвої солі).
[BOO3]Пеніциламін (Penicillamine)	Таблетки: 250 мг.
[BOO3]Сульфасалазин (Sulfasalazine)	Таблетки: 500 мг.
30.3. Лікування ювенільного артриту	
[BOO3]Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)*	Таблетки: від 100 мг до 500 мг * Для використання при ревматизмі, ювенільному артриті, хворобі Кавасакі.

30.4. Лікарські засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток	
[ДФ] Стронцію ранелат (Strontium ranelate)	Гранули 2 г.
30.5. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях суглобів	
[ДФ] Мелоксикам (Meloxicam)	Таблетки: 7,5 мг, 15 мг. Супозиторії ректальні: 0,015 г. Розчин для ін'єкцій: 15 мг/1,5мл по 1,5 мл в ампулах.
[ДФ] Хондроїтин сульфат (Chondroitin sulfate)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл. Капсули: 500 мг. Емульгель для зовнішнього застосування: 5%. Мазь: 50 мг/г. Таблетки: 250 мг , 750 мг.
[ДФ] Целекоксиб (Celecoxib)	Капсули: 100 мг; 200 мг.

До Національного переліку основних лікарських засобів включено основний перелік та додатковий перелік лікарських засобів.

Основний перелік лікарських засобів представлений переліком лікарських засобів для мінімальних потреб базової системи охорони здоров'я, в який включені найбільш ефективні, безпечні лікарські засоби з найвищими показниками вартість-ефективність для пріоритетних станів. Пріоритетні стани відбираються виходячи з нинішньої та передбачуваної в майбутньому значущості для охорони здоров'я та можливостей для безпечного лікування з найвищими показниками вартість-ефективність.

Додатковий перелік представлений основними лікарськими засобами для пріоритетних захворювань, що потребують спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовки фахівців. У разі сумнівів лікарські засоби також можуть бути внесеними в перелік як додаткові з урахуванням сталої високої вартості чи меншої привабливості ефективності витрат в різних умовах.

У Національному переліку основних лікарських засобів застосовуються наступні позначення:

Символ () призначений для вказівки аналогічного клінічного ефекту в межах фармакологічного класу. Лікарський засіб у переліку має бути прикладом класу, для якого існують найкращі докази ефективності та безпеки. У деяких випадках, це може бути перший зареєстрований

лікарський засіб, а в інших – наступні зареєстровані лікарські засоби, які можуть бути більш безпечними або мати кращий показник вартість-користь. У разі відсутності різниці в інформації щодо ефективності та безпеки, у переліку повинен бути той лікарський засіб, який доступний за найнижчою ціною, з урахуванням міжнародних джерел інформації про ціни на лікарські засоби. Не всі лікарські засоби, відмічені квадратною рамкою, можна застосовувати при виборі лікарського засобу для дітей. Терапевтична еквівалентність вказується лише на основі доказів щодо ефективності та безпеки.

Символ ☒ вказує, що є обмеження за віком або вагою для використання лікарського засобу. Особливості застосування для кожного лікарського засобу зазначені у таблиці 1.

Символ */cn/* якщо він знаходиться поруч з додатковим переліком – це означає, що лікарський засіб вимагає спеціалізованого діагностичного або спостережного обладнання, та/або спеціалізованої медичної допомоги, та/або підготовка фахівців для використання у дітей.

Символ *[д]* якщо він знаходиться слідом за конкретним лікарським засобом або силою дії лікарського засобу – це означає, що наявні спеціальні вказівки для обмеження його використання для дітей.

Символи ^[ВООЗ] та ^[ДФ] вказують на джерело рекомендацій: міжнародні експерти ВООЗ або національні експерти-розробники Державного формуляру лікарських засобів.

Лікарські засоби та лікарські форми перераховані в алфавітному порядку в кожному розділі без переваг однієї форми над іншою.

Визначення термінів та вимоги до якості, що застосовуються до різних лікарських форм, відповідають вимогам Державної Фармакопеї України

Лікарські засоби, що мають обмеження до застосування за вагою або віком

Атазанавір	>25 кг
Атропін	>3 місяців
Бензил бензоат	>2 років
Бетаметазон, топічні форми	Для новонароджених перевага надається гідрокортизону
Цефазолін	>1 місяця
Цефтріаксон	>41 тижня з урахуванням внутрішньочеревного розвитку
Дилоксанід	>25 кг
Доксициклін	>8 років (окрім серйозних інфекцій, наприклад, холери)
Ефавіренз	>3 років або >10 кг
Емтрицитабін	>3 місяців
Флуоксетин	>8 років

Ібупрофен	>3 місяців (окрім IV стадії відкритого артеріального протоку)
Мефлохін	>5 кг або >3 місяців
Метоклопрамід	Не використовувати у новонароджених
Ондансетрон	>1 місяць
Саквінавір	>25 кг
Сульфадіазин срібла	>2 місяців
Тетракаїн	Не використовувати у новонароджених
Триметоприм	>6 місяців
Ксилометазолін	>3 місяців

**Пояснення до лікарських форм, які визначені у
Національному переліку основних лікарських засобів.**

А. Основні лікарські форми, які використовуються у Національному переліку основних лікарських засобів для орального застосування.

Термін	Визначення
Тверді оральні лікарські форми	Відноситься до таблеток або капсул або інших твердих лікарських форм, що «розчиняються», які є препаратами з негайним вивільненням. Це означає, що немає ніякої різниці в клінічній ефективності та безпеці між доступними лікарськими формами, і тому слід обирати форму(и), які внесені до переліку, в залежності від якості та доступності. Термін «тверда оральна лікарська форма» не застосовується до таблеток з модифікованим вивільненням.
Таблетки	Відноситься до: невкритих або вкритих (плівкою або цукровою оболонкою) таблеток, призначених для ковтання цілими; з ризикою та без ризику*; таблетки, які призначені для жування перед ковтанням; таблетки, що диспергуються або розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням; таблетки, що призначені для подрібнення перед ковтанням. Термін «таблетка» без подальших уточнень не застосовується до таблеток з модифікованим вивільненням.
Таблетки (категорії)	Відноситься до конкретних типів таблеток: жувальні – таблетки, призначені для жування перед ковтанням; що диспергуються – таблетки, що диспергуються або розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням;

	розчинні – таблетки, які розчиняються у воді або іншій рідині перед ковтанням; подрібнювані – таблетки, що призначені для подрібнення перед ковтанням; з рискою – таблетки, що мають місце для розлому для отримання дози менше 1 таблетки; сублінгвальні – таблетки, які призначені для розміщення під язик. Термін «таблетка» кваліфікується додатковим терміном (у дужках) у випадках, де мається на увазі один з наступних типів таблеток: гастрорезистентні (такі таблетки можуть іноді бути описані як вкриті кишковорозчинною оболонкою або з відстроченим вивільненням), з пролонгованим вивільненням або інші форми з модифікованим вивільненням.
Капсули	Відноситься до твердих або м'яких капсул. Термін «Капсула» без подальших уточнень не застосовується до капсул з модифікованим вивільненням.
Капсули (категорії)	Термін «капсула» з вказанням категорії відноситься до гастрорезистентних (такі капсули можуть іноді бути описані як вкриті кишковорозчинною оболонкою або з відстроченим вивільненням), з пролонгованим вивільненням або інші форми з модифікованим вивільненням.
Гранули	Препарати, які видаються пацієнту у вигляді гранул для ковтання без жодної додаткової підготовки, для жування, або для прийому з водою або іншою рідиною. Термін «гранули», без подальших уточнень не застосовується до гранул з модифікованим вивільненням.
Порошок для орального застосування	Препарати, які видаються пацієнту у вигляді порошку (зазвичай у вигляді однієї дози) для прийому з водою або іншою рідиною.
Рідина для орального застосування	Рідкі препарати, призначені для ковтання, тобто оральні розчини, суспензії, емульсії та оральний краплі, в тому числі відновлені з порошоків або гранул, але не відноситься до препаратів, що призначені для введення через слизову оболонку рота, наприклад, рідини для полоскання горла або полоскання ротової порожнини. Рідини для орального застосування, представлені у вигляді порошоків або гранул, можуть мати переваги завдяки більшій стабільності та меншим транспортним витратам. Якщо на ринку наявні більше одного типу рідин для орального застосування є (наприклад, розчин, суспензія, гранули для відновлення), вони можуть бути взаємозамінними і в таких випадках мають бути

	біоеквівалентними. Перевага надається рідинам для орального застосування, що не містять цукру, та рідинам для дітей, що не містять спирту.
--	--

* Таблетки з ризиком можуть бути розділені для полегшення ковтання, забезпечуючи дозу цілої таблетки.

В. Основні лікарські форми, які використовуються у Національному переліку основних лікарських засобів для парентерального застосування.

Термін	Визначення
Ін'єкція	Відноситься до розчинів, суспензій та емульсій, включаючи ті, що отримані з порошків або концентрованих розчинів.
Ін'єкція (категорії)	Шлях введення вказується у дужках за необхідності.
Ін'єкція (олійна)	Термін «ін'єкція» у відповідних записах містить уточнення (олійна).
Внутрішньовенна інфузія	Відноситься до розчинів, суспензій та емульсій, включаючи ті, що утворюються з порошків або концентрованих розчинів.

С. Інші лікарські форми, які використовуються у Національному переліку основних лікарських засобів.

Шлях введення	Термін, що використовується
Очні	Для очних крапель, очних мазей.
Топічні	Для рідин: лосьйони, в'язкі рідини, що наносяться спеціальним засобом (пензликом). Для напівтвердих речовин: крем, мазь.
Ректальні	Супозиторії, гелі або розчини.
Вагінальні	Пессарії або вагінальні таблетки.
Інгаляційні	Порошок для інгаляцій, інгаляція у балонах, небулайзер.