

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____ р. № _____

ПЕРЕЛІК

**лікарських засобів, які мають увійти до Національного переліку
основних лікарських засобів за умови їх реєстрації в Україні**

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовою	Форма випуску, сила дії лікарського засобу
1. АНЕСТЕТИКИ	
1.1. Загальні анестетики та кисень	
1.1.1. Інгаляційні лікарські засоби	
Галотан (Halothane)	Медичний газ.
Диетиловий етер (Aether pro narcosi)	Рідина у флаконах.
Ізофлуран (Isofluran)	Медичний газ. Розчин для інгаляцій: 100 мл, 250 мл.
1.1.2. Ін'єкційні лікарські засоби	
1.2. Місцеві анестетики	
Бупівакаїн (Bupivacaine)	Розчин для ін'єкцій для спинномозкової анестезії: 0,5% (гідрохлорид) у 4-мл амп. для змішування з 7,5% розчином глюкози.
Лідокаїн (Lidocaine)	Розчин для ін'єкцій: 1% (гідрохлорид). Розчин для ін'єкцій для спинномозкової анестезії: 5% (гідрохлорид) у 2-мл амп. для змішування з 7,5% розчином глюкози.
Лідокаїн + Епінефрин/Адреналін (Lidocaine + Epinephrine/Adrenaline)	Зубний картридж: 2% (гідрохлорид) + епінефрин 1:80 000. Розчин для ін'єкцій : 1% (гідрохлорид або сульфат) + епінефрин 1:200 000 у флаконі; 2% (гідрохлорид або сульфат) + епінефрин 1:200 000 у флаконі.

Додатковий перелік	
Ефедрин (Ephedrine)	Розчин для ін'єкцій: 30 мг (гідрохлорид)/мл у 1-мл амп. Для спинномозкової анестезії під час пологів з метою профілактики запобігання гіпотензії.
1.3. Передопераційна підготовка та забезпечення короткотривалих процедур	
Мідазолам (Midazolam)	Розчин для перорального застосування: 2 мг/мл [д]. Таблетки: 7,5 мг; 15 мг.
2. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ ТА НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ	
2.1. Неопіоїдні та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НСПЗЛЗ)	
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)	Супозиторії: 50 мг до 150 мг.
Парацетамол (Paracetamol) *	Розчин для перорального застосування*: 125 мг/5 мл Супозиторії: 100 мг * Розчин для перорального застосування не рекомендований для протизапального застосування через відсутність доведеної користі.
2.2. Опіоїдні анальгетики	
Морфін (Morphine)*	Розчин для перорального застосування: 10 мг (морфіну гідрохлорид або морфіну сульфат)/5 мл. Таблетки (пролонгованого вивільнення): 10 мг; 30 мг; 60 мг (морфіну сульфат) * – альтернативними засобами є гідроморфон і оксикодон.
2.3. Лікарські засоби для симптоматичної терапії у паліативній допомозі	
Амітриптилін (Amitriptyline)	Таблетки: 10 мг.
Гіосцину гідробромід (Hyoscine hydrobromide) [д]	Розчин для ін'єкцій: 400 мкг/мл; 600 мкг/мл. Пластир трансдермальний: 1 мг/72 години.
Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин оральний: 2 мг/5 мл.
Діазепам (Diazepam)	Розчин пероральний: 2мг/5 мл. Розчин ректальний: 2,5 мг; 5 мг; 10 мг.
Докузат натрію (Docusate sodium)	Капсули: 100 мг Розчин оральний: 50 мг/5 мл.

Ібупрофен (Ibuprofen) ☒ [д]	Таблетки: 600 мг ☒ >3 місяців.
Морфін (Morphine) [д]	Гранули (з модифікованим вивільненням) (для змішування з водою): 20 мг; 30 мг; 60 мг; 100 мг; 200 мг. Розчин оральний: 10 мг/5 мл. Таблетки (з контрольованим вивільненням): 30 мг; 60 мг.
Сена (Senna) [д]	Розчин оральний: 7,5 мг/5 мл.
Циклізин (Cyclizine) [д]	Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл. Таблетки: 50 мг.
3. ПРОТИАЛЕРГІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ТА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ АНАФІЛАКСІЇ	
Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/ Adrenaline)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг (у вигляді гідрохлорид або гідротартрат) у 1-мл амп.
☐ Преднізолон (Prednisolone)	Розчин для перорального застосування: 5 мг/мл. [д] Таблетки: 25 мг.
4. АНТИДОТИ ТА ІНШІ РЕЧОВИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ОТРУСННІ	
4.1. Неспецифічні	
4.2. Специфічні	
Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)	Розчин для ін'єкцій: 200 мг/мл у 10-мл амп.
Калій-залізо гексаціаноферрат (II) (Potassium ferric hexacyano-ferrate(II) – 2H ₂ O (Prussian blue))	Порошок для перорального застосування.
Метилтионіну хлорид/Метиленовий синій (Methylthioninium chloride/Methylene blue)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг/мл у 10-мл амп.
Натрію нітрит (Sodium nitrite)	Розчин для ін'єкцій: 30 мг/мл у 10-мл амп.
Натрію тіосульфат (Sodium thiosulphate)	Розчин для ін'єкцій: 250 мг/мл у 50-мл амп.
Додатковий перелік	
Дімеркапрол (Dimercaprol)	Розчин для ін'єкцій: олійна: 50 мг/мл у 2-мл амп.

Натрію, Кальцію едентат (Sodium, Calcium edentate)	Розчин для ін'єкцій: 200 мг/мл у 5-мл амп.
Сукцимер (Succimer)	Тверді оральні лікарські форми: 100 мг.
5. АНТИКОНВУЛЬСАНТИ/ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ	
Вальпроєва кислота/Натрію вальпроат (Valproic acid/Sodium valproate)	Розчин для перорального застосування: 200 мг/5 мл. Таблетки з рискою: 100 мг.
Діазепам (Diazepam)	Гель або ректальний розчин: 5 мг/мл у тубах по 0,5 мл; по 2 мл; по 4 мл.
Карбамазепін (Carbamazepine)	Таблетки (жувальні): 100 мг; 200 мг. Таблетки з рискою: 100 мг.
Лоразепам (Lorazepam)	Парентеральні форми: 2 мг/мл у 1-мл амп.; 4 мг/мл у 1-мл амп.
Магнію сульфат (Magnesium sulphate)*	Розчин для ін'єкцій: 500 мг/мл у 2-мл амп.; у 10-мл амп. * Для використання при еклампсії та важкій пре-еклампсії, не використовувати при інших конвульсивних розладах.
Фенобарбітал (Phenobarbital)	Розчин для ін'єкцій: 200 мг/мл (натрій). Розчин для перорального застосування: 15 мг/5 мл. Таблетки: 15 мг.
Фенітоїн (Phenytoin)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг/мл у 5-мл у фл. (сіль натрію). Розчин для перорального застосування: від 25 мг до 30 мг/5 мл. Тверді оральні лікарські форми: 25 мг; 50 мг; 100 мг (сіль натрію). Таблетки (жувальні): 50 мг.
Додатковий перелік	
Етосуксимід (Ethosuximide)	Капсули: 250 мг. Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл.
6. ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
6.1. Антигельмінтні лікарські засоби	
6.1.1. Кишкові антигельмінтні лікарські засоби	
Мебендазол (Mebendazole)	Таблетки (жувальні): 500 мг.
Ніклозамід (Niclosamide)	Таблетки (жувальні): 500 мг.
Празиквантел (Praziquantel)	Таблетки: 150 мг.

6.1.2. Антифілярійні лікарські засоби	
Диетилкарбамазепін (Diethylcarbamazine)	Таблетки: 50 мг; 100 мг (дигідрогену цитрат).
Івермектин (Ivermectin)	Таблетки з ризикою: 3 мг.
6.1.3. Антишистосомічні та інші антитрематодні лікарські засоби	
Триклабендазол (Triclabendazole)	Таблетки: 250 мг.
Додатковий перелік	
Оксамніхін (Oxamniquine)*	Капсули: 250 мг. Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл. *Оксамніхін слід використовувати, якщо лікування празиквантелом не допомагає.
6.2. Антибактеріальні лікарські засоби	
6.2.1. Бета-лактамі лікарські засоби	
Бензатину бензилпеніцилін (Benzathine benzylpenicillin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 900 мг. бензилпеніциліну (= 1,2 млн. МО) у 5-мл флаконі.[д]
Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 3 г (= 5 млн. МО) (натрієвої або калієвої солі).
Клоксацилін (Cloxacillin)	Капсули: 500 мг; 1 г (у вигляді натрієвої солі). Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконі. Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 125 мг (у вигляді натрієвої солі)/5 мл.
Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin)*	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 1 г (=1 млн. МО); 3 г (=3 млн. МО) у флаконі. * Прокаїну бензилпеніцилін не рекомендований у якості першої лінії лікування неонатального сепсису, окрім умов з високою смертністю новонароджених, під професійним наглядом, у випадках, коли лікування у госпіталі не можливе.
Феноксиметилпеніцилін (Phenoxymethylpenicillin)	Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 250 мг (у вигляді калієвої солі)/5 мл. Таблетки: 250 мг (у вигляді калієвої солі).

Додатковий перелік	
Іміпенем + Циластатин (Imipenem* + Cilastatin)*	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг (у вигляді моногідрату) + 250 мг (у вигляді натрієвої солі). * Призначається лише для лікування лікарняних інфекцій, що загрожують життю, через підозрювану або доведену інфекцію, резистентну до комбінованої терапії.
6.2.2. Інші антибактеріальні лікарські засоби	
Гентаміцин (Gentamicin)	Розчин для ін'єкцій: 10 мг.
Доксициклін (Doxycycline) ☒	Розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д] Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл (безводний) [д]. Тверді оральні лікарські форми: 50 мг [д] ☒ – використання у дітей віком <8 років допустиме лише для лікування інфекцій, що загрожують життю, за відсутності альтернатив.
Еритроміцин (Erythromycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 500 мг (у вигляді лактобіонату) у флаконі. Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 125 мг/5 мл (у вигляді стеарату або естолату або етилу сукцинату).
Метронідазол (Metronidazole)	Розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату)/5 мл. Супозиторії: 1 г.
Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)	Розчин для перорального застосування: 25 мг/5 мл [д].
Триметоприм (Trimethoprim) ☒	Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д]. Таблетки: 100 мг; 200 мг ☒ >6 місяців.
Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	Олійна суспензія для ін'єкцій*: 0,5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл у 2-мл амп. *Лише для пробного лікування епідемічного менінгіту у дітей старше 2 років. Розчин для перорального застосування: 150 мг (у вигляді пальмітату)/5 мл.
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	Розчин для перорального застосування: 250 мг/5 мл (безводний) [д].
Додатковий перелік	

Ванкоміцин (Vancomycin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 250 мг (гідрохлорид) у флаконі.
Кліндаміцин (Clindamycin)	Розчин для перорального застосування: 75 мг/5 мл (пальмітат) [д].
6.2.3. Антилепрозійні лікарські засоби	
Лікарські засоби для лікування прокази повинні завжди використовуватися у комбінації. Комбінована терапія є необхідною для запобігання виникненню резистентності до лікарських засобів. Забарвлені упаковки, що містять комбінації 2 лікарських засобів (малобацилярна проказа) або 3 лікарських засобів (мультибацилярна проказа) слід використовувати для лікування прокази у дорослих та дітей. Блістери для комбінованої терапії (MDT) можуть постачатися ВООЗ безкоштовно.	
Дапсон (Dapsone)	Таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг
6.2.4. Протитуберкульозні лікарські засоби	
ВООЗ рекомендує та погоджує використання фіксованих комбінацій, а також розробку нових належних фіксованих комбінацій, включаючи форми випуску з модифікованим вивільненням, незаморожених продуктів та педіатричних форм достовірної фармацевтичної якості.	
Етамбутол (Ethambutol)	Розчин для перорального застосування: 25 мг/мл [д]. Таблетки: 100 мг
Етамбутол + Ізоніазид (Ethambutol + Isoniazid)	Таблетки: 400 мг + 150 мг.
Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin)	Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл. [д]
Ізоніазид (Isoniazid)	Таблетки з ризикою: 50 мг. [д]
Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	Таблетки: 75 мг + 400 мг + 150 мг; 150 мг + 500 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень).
Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)	Таблетки: 150 мг + 300 мг; 60 мг + 60 мг /150 мг + 150 мг (для переривчастого використання тричі на тиждень). Розчин для перорального застосування: 30 мг/мл. [д]
Піразинамід (Pyrazinamide)	Таблетки: 400 мг. Таблетки (дисперсивні): 150 мг. Таблетки з ризикою: 150 мг.
Рифампіцин (Rifampicin)	Розчин для перорального застосування: 20 мг/мл. [д]
Додатковий перелік	
Лікарські засоби другої лінії для лікування хіміорезистентного туберкульозу (multidrug-resistant tuberculosis) слід використовувати у спеціалізованих центрах, дотримуючись стандартів ВООЗ щодо контролю туберкульозу.	

Амікацин (Amikacin)	Порошок для приготування розчину для ін'єкцій: 100 мг.
Етіонамід (Ethionamide)*	Таблетки: 125 мг.
Канаміцин (Kanamycin)	Таблетки: 200 мг; 400 мг.
6.3. Протигрибкові лікарські засоби	
Гризеофульвін (Griseofulvin)	Розчин для перорального застосування: 125 мг/5 мл [д]. Таблетки: 250 мг.
Клотримазол (Clotrimazole)	Вагінальний крем: 1%; 10%.
Ністатин (Nystatin)	Пастилки: 100 000 МО. Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл [д]; 100 000 МО/мл. [д] Пессарій: 100 000 МО. Таблетки: 100 000 МО.
Флуконазол (Fluconazole)	Розчин для перорального застосування: 50 мг/5 мл.
Флуцитозин (Flucytosine)	Капсули: 250 мг.
Додатковий перелік	
Калію йодид (Potassium iodide)	Насичений розчин.
6.4. Противірусні лікарські засоби	
6.4.1. Протигерпесні лікарські засоби	
6.4.2. Антиретровірусні лікарські засоби	
На основі сучасних доказів та досвіду використання, антиретровірусні лікарські засоби наступних трьох класів включені до переліку основних лікарських засобів для лікування та профілактики ВІЛ (профілактика перенесення від матері до дитини, а також профілактика після контакту). ВООЗ підкреслює важливість використання цієї групи лікарських засобів у відповідності до глобальних та національних настанов медичної допомоги. ВООЗ схвалює та рекомендує використовувати фіксовані комбінації, розробляти нові комбінації з фіксованими дозами, включаючи модифіковані лікарські форми, лікарські форми, що не потребують охолодження, та педіатричні лікарські форми належної якості. Таблетки з ризикою можуть використовуватися у дітей, тому вони можуть бути включені до номенклатури, за умови наявності препаратів відповідної якості.	
6.4.2.1. Нуклеозидні/нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази	
Диданозин (Didanosine (DDI))	Таблетки (буферизовані жувальні, дисперсивні): 25 мг; 50 мг; 150 мг. Буферизований порошок для приготування розчину для перорального застосування: 10 мг/мл.

Емтрицитабін (Emtricitabine (FTC)) * ☒	Розчин оральний: 10 мг/мл. * FTC є прийнятною альтернативою ЗТС, на основі знань фармакології, моделей резистентності та клінічних досліджень антиретровірусних лікарських засобів. ☒ >3 місяців.
Ставудин (Stavudine (D4T))	Капсули: 15 мг; 20 мг. Порошок для приготування розчину для перорального застосування: 5 мг/5 мл.
6.4.2.2. Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази	
Ефавіренз (Efavirenz (EFV або EFZ)) ☒	Капсули: 50 мг; 100 мг. Розчин для перорального застосування: 150 мг/5 мл. ☒ >3 років або >10 кг.
6.4.2.3. Інгібітори протеази	
Вибір інгібіторів протеази з Базового переліку повинен визначатися кожною країною після вивчення міжнародних та національних клінічних настанов та досвіду. Ритонавір рекомендований для використання у комбінації у якості фармакологічного стимулятора, а не окремого антиретровірусного засобу. Решта інгібіторів протеази повинна використовуватися у формі зі стимулятором (наприклад, з ритонавіром).	
Атазанавір (Atazanavir) ☒	Тверді оральні лікарські форми: 100 мг; 150 мг; 300 мг (у вигляді сульфату). ☒ >25 кг.
Ритонавір (Ritonavir)	Розчин оральний: 400 мг/5 мл. Таблетки: 25 мг.
Саквінавір (Saquinavir (SQV)) ☒	Тверді оральні лікарські форми: 200 мг; 500 мг (у вигляді мезилату) ☒ >25 кг.
Фіксовані комбінації	
Ламівудин+Невірапін+Ставудин (Lamivudine + Nevirapine + Stavudine)	Таблетки: 150 мг + 200 мг + 30 мг [д]. Таблетки (дисперговані): 30 мг + 50 мг + 6 мг; 60 мг + 100 мг + 12 мг [д].
Ламівудин+Невірапін+Зидовудин (Lamivudine + Nevirapine + Zidovudine)	Таблетки: 30 мг + 50 мг + 60 мг [д]; 150 мг + 200 мг + 300 мг.
6.4.3. Інші противірусні засоби	
Рибавірін (Ribavirin)*	Ін'єкції для внутрішньовенного застосування: 800 мг в 10 мл фосфатного буферного розчину. * тільки для лікування вірусних геморагічних лихоманок в поєднанні з інтерфероном рекомбінантним пегільованим для лікування гепатиту С.

Додатковий перелік	
Інтерферон альфа-2b рекомбінантний людини пегільований (Pegylated interferon alpha (2a or 2b) *	Флакон або шприц: 180 мкг (peginterferon alfa-2a).
6.5. Засоби для лікування протозойних інфекцій	
6.5.1. Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу	
Дилоксанід (Diloxanide) ☒	Таблетки: 500 мг (фуроат) ☒ >25 кг.
Метронідазол (Metronidazole)	Розчин оральний: 200 мг (бензоат)/5 мл.
6.5.2. Засоби для лікування лейшманіозу	
Мілтефозін (Miltefosine)	Тверді оральні лікарські форми: 10 мг; 50 мг.
Натрію стиболглюконат або Меглюмін антимоніат (Sodium stibogluconate or Meglumine antimoniate)*	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл, 1 флакон = 30 мл або 30%, що еквівалентно приблизно 8,1% сурмі (п'ятивалентній) по 5 мл в ампулах.
Парономіцин (Paromomycin)	Розчин для ін'єкцій: 750 мг парономіцину (у вигляді сульфату).
6.5.3. Засоби для лікування малярії	
6.5.3.1. Для лікування малярії	
Лікарські засоби для лікування інфекції, спричиненої <i>P. falciparum malaria</i> (тропічної малярії), повинні застосовуватись у комбінаціях. Даний перелік рекомендує комбінації згідно рекомендацій лікування. ВООЗ визнає, що існують не всі з цих FDC та пропонує їх розвиток та ретельне тестування. Комітет також пропонує розробку та тестування ректальних лікарських форм.	
Амодіахін (Amodiaquine)*	Таблетки: 153 мг; 200 мг (гідрохлориду). * Застосовується в комбінації з артезунатом 50 мг.
Артеметер (Artemether)*	Розчин олійний 80 мг/мл в ампулах по 1 мл. * Для лікування важкої малярії.
Артеметер+Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine)*	Таблетки: 20 мг + 120 мг. Таблетки (дисперговані): 20 мг + 120 мг [д]. * Не рекомендований у першому триместрі вагітності або дітям вагою до 5 кг.
Артезунат (Artesunate)*	Ін'єкції: ампули, що містять 60 мг безводної артезунатової кислоти з окремою ампулою 5% розчину натрію бікарбонату. Застосовується для лікування тяжкої малярії. Ректальна лікарська форма: 50 мг. [д] Ректальна лікарська форма: 200 мг. [д] Застосовується тільки для попереднього

	лікування важкої малярії; пацієнти повинні бути направлені до відповідного медичного закладу для подальшого спостереження [д]. Таблетки: 50 мг * для застосування в комбінації з амодіахіном або мефлохіном або сульфадоксином+піриметаміном.
Артезунат+Амодіахін (Artesunate + Amodiaquine) *	Таблетки: 25 мг + 67,5 мг; 50 мг + 135 мг; 100 мг + 270 мг. * Інші комбінації, що забезпечують необхідні цільові дози, такі як 153 мг або 200 мг (у вигляді гідрохлориду) разом з 50 мг артезунату можуть бути альтернативою.
Прімахін (Primaquine)*	Таблетки: 7,5 мг; 15 мг (у вигляді дифосфату). * Використовувати протягом 14 днів лише для досягнення радикального лікування інфекції, спричиненої P.vivax та P.ovale.
Сульфадоксин+Піриметамін (Sulfadoxine + Pyrimethamine)*	Таблетки: 500 мг + 25 мг * Застосовувати тільки в комбінації з артезунатом 50 мг.
Хінін (Quinine)*	Ін'єкції: 300 мг хініну гідрохлориду/мл в ампулах по 2 мл. Таблетки: 300 мг хініну сульфату або бісульфату * Використовувати тільки для лікування тяжкої малярії, а також необхідно використовувати в комбінації з доксицикліном.
Хлорохін (Chloroquine)*	Розчин оральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл. Таблетки: 100 мг; 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату). * Використовувати тільки для лікування інфекції, спричиненої P.vivax.
6.5.3.2. Для профілактики малярії	
Прогуаніл (Proguanil)*	Таблетки: 100 мг (у вигляді гідрохлориду) * Для використання тільки у комбінації з хлорохіном.
Хлорохін (Chloroquine)*	Розчин пероральний: 50 мг (у вигляді фосфату або сульфату)/5 мл. Таблетки: 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату). * Для використання тільки у регіонах

	Центральної Америки, застосовувати при інфекції, спричиненої <i>P.vivax</i> .
6.5.4. Засоби для лікування пневмоцистозу та токсоплазмозу	
Піриметамін (Pyrimethamine)	Таблетки: 25 мг.
Сульфадіазин (Sulfadiazine)	Таблетки: 500 мг.
Сульфаметоксазол+ Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	Ін'єкції: 80 мг + 16 мг/мл в ампулах по 5мл та по 10 мл.
Додатковий перелік	
Пентамідин (Pentamidine)	Таблетки: 200 мг; 300 мг (у вигляді ізетіонату).
6.5.5. Лікарські засоби для лікування трипаносомозу	
6.5.5.1. Лікарські засоби для лікування африканського трипаносомозу	
Лікарські засоби для лікування першої стадії африканського трипаносомозу	
Пентамідин (Pentamidine)*	Порошок для ін'єкцій: 200 мг (у вигляді ізетіонату) у флаконах. * Використовується для лікування інфекції, спричиненої <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .
Сурамін натрію (Suramin sodium)*	Порошок для ін'єкцій: 1 г у флаконах. * Використовується для лікування початкової фази інфекції, спричиненої <i>Trypanosoma brucei rhodesiense</i> .
Лікарські засоби для лікування другої стадії африканського трипаносомозу	
Ефлорнітин (Eflornithine)*	Ін'єкції: 200 мг (гідрохлорид)/мл по 100 мл у пляшках. * Використовується для лікування інфекції, спричиненої <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .
Меларсопрол (Melarsoprol)	Ін'єкції: 3,6% розчин по 5мл в ампулах (180 мг активного компоненту).
Нифуртимокс (Nifurtimox)*	Таблетки: 120 мг * Тільки для використання в комбінації з ефлорнітином для лікування інфекції, спричиненої <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> .
Додатковий перелік [cn]	
Меларсопрол (Melarsoprol)	Ін'єкції: 3,6% розчин по 5мл в ампулах (180 мг активного компоненту).
6.5.5.2. Лікарські засоби для лікування американського трипаносомозу	
Бензнідазол (Benznidazole)	Таблетки: 100 мг.
Нифуртимокс (Nifurtimox)	Таблетки: 30 мг; 120 мг; 250 мг.

7. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ	
7.1. Для лікування гострого нападу мігрені	
Парацетамол (Paracetamol)	Таблетки: 300 мг
7.2. Для профілактики мігрені	
8. ПРОТИПУХЛИННІ, ІМУНОСУПРЕСИВНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
8.1. Імуносупресивні лікарські засоби	
<i>Додатковий перелік</i>	
Азатіоприн (Azathioprine)	Порошок для ін'єкцій: 100 мг (у вигляді натрієвої солі) у флаконах.
8.2 Цитотоксичні та ад'ювантні лікарські засоби	
<i>Додатковий перелік</i>	
Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	Таблетки: 25 мг.
Даунорубіцин (Daunorubicin)	Порошок для ін'єкцій: 50 мг (гідрохлорид) у флаконах.
Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)	Тверді оральні лікарські форми: 200 мг; 250 мг; 300 мг; 400 мг; 1 г.
Меркаптопурин (Mercaptopurine)	Таблетки: 50 мг (гідрохлорид) у флаконах.
Месна (Mesna)	Розчин для ін'єкцій: 100 мг/мл по 10 мл в ампулах. Таблетки: 400 мг; 600 мг.
Тіогуанін (Thioguanine) [сн]	Тверді оральні лікарські форми: 40 мг.
8.3. Гормони та антигормони	
<i>Додатковий перелік</i>	
Дексаметазон (Dexamethasone)	Розчин оральний: 2мг/5 мл [сн].
Метилпреднізолон (Methylprednisolone) [сн]	Порошок для ін'єкцій: 40 мг/мл (у вигляді натрію сукцинату) по 5 мл багато доз у флаконах.
Преднізолон (Prednisolone)	Розчин оральний: 5 мг/мл [сн]. Таблетки: 25 мг.
9. ПРОТИПАРКІНСОНІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
Біперидин (Biperiden)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг (лактат) по 1 мл в ампулах. Таблетки: 2 мг (гідрохлорид).
Леводопа+ Карбідopa (Levodopa + Carbidopa)	Таблетки: 100 мг + 10 мг.

10. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КРОВ	
10.1 Антианемічні лікарські засоби	
Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг (у вигляді ацетату, гідрохлориду або сульфату) по 1 мл в ампулах.
Заліза сіль (Ferrous salt)	Розчин оральний: еквівалентно 25 мг заліза (у вигляді сульфату)/мл. Таблетки: еквівалентно 60 мг заліза.
10.2 Лікарські засоби, що впливають на коагуляцію та гемостатичні засоби	
☐ Варфарин (Warfarin)	Таблетки: 1 мг; 2 мг (натрієва сіль).
Гепарин натрій (Heparin sodium)	Розчин для ін'єкцій: 1000 МО/мл по 1 мл в ампулах; 20000 МО/мл по 1 мл в ампулах.
Фітоменадіон (Phytomenadione)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг/мл [д]. Таблетки: 10 мг.
Додатковий перелік [сн]	
☐ Варфарин (Warfarin)	Таблетки: 0,5 мг; 1 мг; 2 мг (натрієва сіль).
Гепарин натрій (Heparin sodium)	Розчин для ін'єкцій: 1000 МО/мл по 1 мл в ампулах.
10.3. Інші лікарські засоби, що застосовуються при гемоглобінопатіях	
Додатковий перелік	
Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)	Тверді оральні лікарські форми: 200 мг; 1 г.
11. ПРЕПАРАТИ КРОВІ ТА ПЛАЗМОЗАМІННІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЛЮДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ	
11.1. Кров та її компоненти	
ВООЗ визнає, що досягнення самозабезпеченості, за винятком особливих обставин що перешкоджають цьому, у постачанні безпечних компонентів крові на основі добровільного, безоплатного донорства крові, та безпеки поставки є важливими національними цілями для запобігання нестачі крові та задоволення потреби населення в переливанні. Всі препарати повинні відповідати вимогам ВООЗ.	
11.2. Лікарські засоби, отримані з плазми	
Всі фракції плазми крові повинні відповідати вимогам Керівництва ВООЗ щодо забору, обробки та контролю якості крові, компонентів крові та похідних плазми (Revised 1992). (WHO Technical Report Series, No. 840, 1994, Annex 2).	
11.2.1. Імуноглобуліни людини	

11.2.2. Фактори коагуляції крові	
<i>Додатковий перелік</i>	
Фактор коагуляції VIII (Coagulation Factor VIII)	Порошок для ін'єкцій: 500 МО/флаконі.
Фактор коагуляції IX (Coagulation Factor IX)	Порошок для ін'єкцій: 500 МО/флаконі, 1000 МО/флаконі.
11.3. Плазмозамінні лікарські засоби	
Декстран 70 (Dextran 70)*	Ін'єкційний розчин: 6%. * Полігелін, ін'єкційний розчин 3,5% привірюється до еквіваленту.
12. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ	
12.1. Антиангінальні лікарські засоби	
☐ Бісопролол (Bisoprolol)*	Таблетки: 1,25 мг. * ☐ в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи.
12.2. Антиаритмічні лікарські засоби	
☐ Бісопролол (Bisoprolol)*	Таблетки: 1,25 мг. * ☐ в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи.
Дигоксин (Digoxin)	Розчин оральний: 50 мкг/мл Таблетки: 62,5 мкг.
Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	Розчин для ін'єкцій: 100 мкг/мл (у вигляді тартрату або гідрохлориду) по 10 мл в ампулах.
<i>Додатковий перелік</i>	
Аміодарон (Amiodarone)	Таблетки: 100 мг (гідрохлорид)
12.3. Антигіпертензивні лікарські засоби	
☐ Бісопролол (Bisoprolol)*	Таблетки: 1,25 мг. * ☐ в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи.
Гідралазин (Hydralazine)*	Порошок для ін'єкцій: 20 мг (гідрохлорид) в ампулах. Таблетки: 25 мг; 50 мг (гідрохлорид). * Гідралазин дозволений тільки для лікування тяжкої гіпертензії, індукованої вагітністю. Не рекомендується його застосування при есенціальній гіпертензії у зв'язку з наявністю суттєвіших доказів ефективності та безпеки інших лікарських засобів.
☐ Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	Таблетки: 12,5 мг. Розчин оральний: 50 мг/5 мл.

Додатковий перелік	
Нітропрусид натрію (Sodium nitroprusside)	Порошок для ін'єкцій: 50 мг в ампулах, флаконах.
12.4. Лікарські засоби, що застосовуються при серцевій недостатності	
☐ Бісопролол (Bisoprolol)*	Таблетки: 1,25 мг. * ☐ в тому числі метопролол та карведілол в якості альтернативи.
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)	Розчин оральний: 50 мг/5 мл.
Дигоксин (Digoxin)	Розчин оральний: 50 мкг/мл. Таблетки: 62,5 мкг.
Фуросемід (Furosemide)	Розчин оральний: 20 мг/5 мл [д].
12.5. Антитромботичні лікарські засоби	
12.6. Гіполіпідемічні лікарські засоби	
☐ Симвастатин (Simvastatin)*	Таблетки: 5 мг. * Для застосування у пацієнтів з високим ризиком розвитку тромбозів.
13. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДЕРМАТОЛОГІЇ (МІСЦЕВІ)	
13.1. Протигрибкові лікарські засоби	
☐ Міконазол (Miconazole)	Мазь: 2%.
Селена сульфід (Selenium sulfide)	Суспензія на основі детергентів: 2%.
Тіосульфат натрію (Sodium thiosulfate)	Розчин: 15%.
Тербінафін (Terbinafine)	Мазь: 1% тербінафіну гідрохлорид.
13.2. Протимікробні лікарські засоби	
13.3. Протизапальні засоби та засоби проти свербіжу	
☐ Каламін (Calamine)	Лосьйон.
13.4. Лікарські засоби, що впливають диференціацію і проліферацію клітин шкіри	
Бензоїлу пероксид (Benzoyl peroxide)	Крем: 5%.
Дьоготь (Coal tar)	Розчин: 5%.
☐ Подофілотоксин (Podophyllum resin)	Розчин: 10% до 25%.
Саліцилова кислота (Salicylic acid)	Розчин: 5%.
Сечовина (Urea)	Крем чи мазь: 5%; 10%.
Фторурацил (Fluorouracil)	Мазь: 5%.

13.5. Засоби для лікування педикульозу та корости	
☐ Бензилбензоат (Benzyl benzoate) ☒	Лосьйон: 25%. ☒ >2 років.
Перметрин (Permethrin)	Лосьйон: 1%. Крем: 5%.
13.6. Інші лікарські засоби	
14. ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ	
14.1. Офтальмологічні лікарські засоби	
Флюоресцеїн (Fluorescein)	Краплі очні: 1% (натрієва сіль).
14.2. Рентгенконтрастні засоби	
☐ Амідотризоат (Amidotrizoate)	Розчин для ін'єкцій: 40 мг до 420 мг йоду (у вигляді натрію або меглумінової солі)/мл по 20 мл в ампулах.
Додатковий перелік	
☐ Меглуміну йотроксат (Meglumine iotroxate)	Розчин: 5 г до 8 г йоду в 100 мл до 250 мл.
15. ДЕЗИНФІКУЮЧІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ	
15.1. Антисептичні засоби	
☐ Хлоргексидин (Chlorhexidine)	Розчин: 5%; 20% (диглюконат) (повинен бути робавлений для обробки пуповини) [д].
15.2. Дезинфікуючі засоби	
☐ Порошок з хлором (Chlorine base compound)	Порошок: 0,1% (доступного хлору) для розчину.
Хлороксиленол (Chloroxylenol)	Розчин: 4,8%.
Глутарал (Glutaral)	Розчин: 2%.
16. ДІУРЕТИКИ	
Амilorид (Amiloride)	Таблетки: 5 мг (гідрохлорид).
☐ Фуросемід (Furosemide)	Розчин оральний: 20 мг/5 мл [д]. Таблетки: 10 мг; 20 мг.
Додатковий перелік [сн]	
Спіронолактон (Spironolactone)	Розчин оральний: 5 мг/5 мл; 10 мг/5 мл; 25мг/5 мл.
17. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ	
Додатковий перелік [сн]	
17.1. Противиразкові лікарські засоби	
Омепразол (Omeprazole)	Порошок для орального розчину: 40 мг саше.
Ранітидин (Ranitidine)*	Оральна рідина: 75 мг/5 мл (гідрохлорид).

17.2. Протиблювотні лікарські засоби	
Дексаметазон (Dexamethasone)	Оральна рідина: 2 мг/5 мл; 0,5 мг/5 мл. Тверді оральні лікарські форми: 0,75 мг; 1,5 мг.
Метоклопрамід (Metoclopramide) ☒	Оральна рідина: 5 мг/5 мл [д] ☒ не застосовується у новонароджених
Ондансетрон (Ondansetron) ☒	Оральна рідина: 4 мг основи/5 мл. Тверді оральні лікарські форми: екв. 24 мг основи ☒ > 1 місяця.
17.3. Протизапальні лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях кишечника	
☐ Сульфасалазин (Sulfasalazine)	Утримуюча клізма Супозиторії: 500 мг.
<i>Додатковий перелік</i>	
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	Утримуюча клізма. Супозиторії: 25 мг (ацетат).
17.4. Проносні лікарські засоби	
17.5. Лікарські засоби, які застосовуються при діарей	
17.5.1. Для пероральної регідратації	
17.5.2. Лікарські засоби від діарей у дітей	
Цинку сульфат (Zinc sulfate)*	Тверді оральні лікарські форми: 20 мг. *При гострій діарей сульфат цинку повинні використовувати в якості доповнення до солей для пероральної регідратації.
17.5.3. Антидіарейні лікарські засоби	
17.6. Спазмолітичні лікарські засоби, що застосовуються при шлунково-кишкових захворюваннях	
18. ГОРМОНИ, ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА КОНТРАЦЕПТИВИ	
18.1. Кортикостероїди та синтетичні замінники	
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	Таблетки: 5 мг.
18.2. Андрогени	
<i>Додатковий перелік</i>	
Тестостерон (Testosterone)	Розчин для ін'єкцій: 200 мг (енантат) в 1-мл ампулі.
18.3. Контрацептиви	
18.3.1. Оральні гормональні контрацептиви	
☐ Етинілестрадіол + ☐ Левоноргестрел	Таблетки: 30 мікрограмів + 150 мікрограмів.

(Ethinylestradiol + Levonorgestrel)	
☐ Етинілестрадіол + ☐ Норетистерон (Ethinylestradiol + Norethisterone)	Таблетки: 35 мікрограмів + 1 мг.
Левоноргестрел (Levonorgestrel)	Таблетки: 30 мікрограмів.
18.3.2. Ін'єкційні гормональні контрацептиви	
Естрадіол ципіонат + Медроксипрогестерон ацетат (Estradiol cypionate + Medroxyprogesterone acetate)	Розчин для ін'єкцій: 5 мг + 25 мг.
Норетистерон енантат (Norethisterone enantate)	Масляний розчин: 200 мг/мл в 1-мл ампулі.
18.3.3. Внутрішньоматкові засоби	
18.3.4. Засоби бар'єрної контрацепції	
18.3.5. Контрацептивні імплантанти	
Левоноргестрел-Рилізінг імплантант (Levonorgestrel-Releasing implant)	Двострижневий імплантант з вивільненням левоноргестрелу: Кожен стрижень містить по 75 мг левоноргестрелу (150 мг загально).
18.4. Естрогени	
18.5. Інсуліни та інші лікарські засоби, що застосовуються для лікування діабету	
Акарбоза (Acarbose)	Таблетки: 50 мг, 100 мг.
Ексенатид (Exenatide)	Розчин для ін'єкцій: 250 мкг/мл по 1,2 мл, 2,4 мл у картриджах.
18.6. Індуктори овуляції	
18.7. Прогестогени	
☐ Медроксипрогестерон ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	Таблетки: 5 мг.
18.8. Гормони щитовидної залози та антитиреоїдні лікарські засоби	
Калію йодид (Potassium iodide)	Таблетки: 60 мг.
☐ Пропілтіоурацил (Propylthiouracil)*	Таблетки: 50 мг * необхідний перегляд використання пропілтіоурацилу у дітей, а також доцільність використання карбамізолу у якості альтернативи.

Додатковий перелік [сн]	
Розчин Люголя (Lugol's solution)	Оральна рідина: 130 мг всього йоду/мл.
Калію йодид (Potassium iodide)	Таблетки: 60 мг.
Пропілтіоурацил (Propylthiouracil)	Таблетки: 50 мг.
18.9. Препарати гормонів гіпофіза	
18.10. Препарати гормонів гіпоталамуса	
19. ІМУНОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
19.1. Діагностичні засоби	
Всі туберкуліни повинні відповідати вимогам ВООЗ для туберкуліну (переглянутий 1985).	
19.2. Сироватки і імуноглобуліни.	
Всі фракції плазми крові повинні відповідати вимогам ВООЗ до збору, обробці і контролю якості крові, компонентів крові і похідних плазми (переглянутий 1992). Комітет експертів ВООЗ з стандартизації біологічних препаратів. Сорок третя доповідь. (ВООЗ Серія технічних доповідей, Кіл. 840, 1994, Додаток 2).	
Анти-D імуноглобулін (людини) (anti-D immunoglobulin (human))	Розчин для ін'єкцій: 250 мкг в одній дозі флакона.
Антитоксин дифтерії (Diphtheria antitoxin)	Розчин для ін'єкцій: 20 000 ОД в флаконі.
Імуноглобулін антирабічний (Rabies immunoglobulin)	Розчин для ін'єкцій: 150 ОД/мл в флаконі.
Протиотрутий імуноглобулін (Antivenom immunoglobulin)*	Розчин для ін'єкцій * сила дії та упаковка визначається на місцях.
Протиправцевий імуноглобулін (людини) (Antitetanus immunoglobulin (human))	Розчин для ін'єкцій: 500 ОД в флаконі.
19.3. Вакцини	
Нижченаведений перелік визначає вакцини, для яких існують рекомендації Стратегічної Дорадчої Групи експертів з імунізації (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)) та/або меморандум ВООЗ (http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/index.html). Цей сайт буде оновлюватися по мірі публікації нових меморандумів і містить найновішу інформацію та рекомендації.	

ВООЗ звертає увагу на необхідність використання у дітей полівалентних вакцин.	
Вакцина проти холери (Cholera vaccine)	
Вакцина проти японського енцефаліту (Japanese encephalitis vaccine)	
Ротавірусна вакцина (Rotavirus vaccine)	
20. МІОРЕЛАКСАНТИ ТА ІНГІБІТОРИ ХОЛІНЕСТЕРАЗИ	
20.1. Міорелаксанти (периферичної дії) та інгібітори холінестерази	
☐ Векуроній (Vecuronium) [д]	Порошок для ін'єкцій: 10 мг (бромід) у флаконі. Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій: 4 мг в ампулах.
Неостигмін (Neostigmine)	Розчин для ін'єкцій: 2,5 мг (метилсульфат) в 1-мл ампулі Таблетки: 15 мг (бромід).
Суксаметоній (Suxamethonium)	Розчин для ін'єкцій: 50 мг (хлорид)/мл в 2-мл ампулі. Порошок для ін'єкцій: (хлорид), у флаконі.
Додатковий перелік	
☐ Векуроній (Vecuronium)	Порошок для ін'єкцій: 10 мг (бромід) у флаконі.
Піридостигмін (Pyridostigmine)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг в 1-мл ампулі.
20.2. Міорелаксанти з центральним механізмом дії	
21. ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ	
21.1. Антибактеріальні лікарські засоби	
Гентаміцин (Gentamicin)	Розчин (очні краплі): 0,3% (сульфат).
21.2. Протизапальні лікарські засоби	
Преднізолон (Prednisolone)	Розчин (очні краплі): 0,5% (натрію фосфат).
21.3. Місцеві анестетики	
Тетракаїн (Tetracaine) ☒	Розчин (очні краплі): 0,5% (гідрохлорид). ☒ не застосовувати у недоношених новонароджених.
21.4. Міотичні і протиглаукомні лікарські засоби	
☐ Пілокарпін (Pilocarpine)	Розчин (очні краплі): 2% (гідрохлорид або нітрат); 4% (гідрохлорид або нітрат).

21.5. Мідріатичні лікарські засоби	
Атропін (Atropine) ☒ *	Розчин (очні краплі): 0,1%; 0,5% (сульфат) * [д] Гоматропін (гідробромід) або Циклопентолат (гідрохлорид). ☒ >3 місяців.
<i>Додатковий перелік</i>	
Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	Розчин (очні краплі): 2% (як гідрохлорид).
21.6. Антифактор росту ендотелію судин	
22. ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ТА ЗНИЖУЮТЬ СКОРОТЛИВУ АКТИВНІСТЬ МІОМЕТРІЮ	
22.1. Засоби, які підвищують скоротливу активність міометрію	
☐ Ергометрин (Ergometrine)	Розчин для ін'єкцій: 200 мікрограмів (гідромалеат) в 1-мл ампулі.
Мізопростол (Misoprostol)	Вагінальні таблетки: 25 мікрограмів.* * Тільки для використання при індукції пологів у разі необхідності.
Окситоцин (Oxytocin)	Розчин для ін'єкцій: 10 ОД в 1-мл.
<i>Додатковий перелік</i>	
Міфепристон (Mifepristone)* – Мізопростол (Misoprostol)*	Таблетки: 200 мг – 200 мікрограмів. * Вимагає ретельного медичного спостереження.
22.2. Засоби, які знижують скоротливу активність міометрію (токолітики)	
Ніфедипін (Nifedipine)	Капсули 10 мг.
23. РОЗЧИНИ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ	
24. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПСИХІЧНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ	
24.1. Лікарські засоби, що застосовуються при психотичних розладах	
☐ Галоперидол (Haloperidol)	Таблетки: 2 мг.
Флуфеназин (Fluphenazine)	Розчин для ін'єкцій: 25 мг (енантат) в 1 мл ампулах.
☐ Хлорпромазин (Chlorpromazine)	Оральна рідина: 25 мг (гідрохлорид)/5мл.
<i>Додатковий перелік</i>	
Галоперидол (Haloperidol) [д]	Оральна рідина: 2 мг/мл Тверді оральні лікарські форми: 0,5 мг; 2 мг.
Клозапін (Clozapine)	Тверді оральні лікарські форми: 200 мг.

Хлорпромазин (Chlorpromazine) [д]	Оральна рідина: 25 мг (гідрохлорид)/5мл. Таблетки: 10 мг (гідрохлорид).
24.2. Лікарські засоби, що застосовуються при порушеннях настрою	
24.2.1. Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах	
24.2.2. Лікарські засоби, що застосовуються при біполярних розладах	
Карбамазепін (Carbamazepine)	Таблетки з ризикою: 100 мг.
24.3. Лікарські засоби при тривожних розладах	
☐ Діазепам (Diazepam)	Таблетки з ризикою: 2 мг.
24.4. Лікарські засоби, що застосовуються при obsесивно-компульсивних розладах	
Кломіпрамін (Clomipramine)	Капсули: 10 мг (гідрохлорид).
24.5. Лікарські засоби для лікування розладів, викликаних вживанням психоактивних речовин	
<i>Додатковий перелік</i>	
☐ Метадон (Methadone)*	Концентрат для оральної рідини: 5 мг/мл; 10 мг/мл (гідрохлорид). Оральна рідина: 10 мг/5 мл (гідрохлорид). * повинен бути використаний тільки в межах програми підтримки.
25. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ	
25.1. Антиастматичні засоби і лікарські засоби для лікування хронічної обструктивної хвороби	
Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	Розчин для ін'єкцій: 1 мг (гідрохлорид або гідротартрат) в 1-мл ампулі.
Іпратропію бромід (Ipratropium bromide)	Інгаляція (аерозоль): 20 мкг /відміреної дози.
☐ Сальбутамол (Salbutamol)	Розчин для ін'єкцій: 50 мікрограмів (як сульфат)/мл в 5-мл ампулі. Респіраторний розчин для використання в розпилювачах: 5 мг (як сульфат)/мл.
26. РОЗЧИНИ ДЛЯ КОРЕЦІЇ ВОДНОГО, ЕЛЕКТРОЛІТНОГО ТА КИСЛОТНО-ЛУЖНОГО БАЛАНСУ, КРОВОЗАМІННИКИ, ПЕРФУЗІЙНІ РОЗЧИНИ	
26.1.Оральні лікарські засоби	
Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)	Див. розділ 17.5.1.

26.2. Парентеральні лікарські засоби	
Глюкоза (Glucose)	Розчин для ін'єкцій: 50% (гіпертонічний).
Глюкоза з Натрію хлоридом (Glucose with Sodium chloride)	Розчин для ін'єкцій: 4% глюкоза, 0,18% натрію хлорид (еквівалентно Na ⁺ 30 ммоль/л, Cl ⁻ 30 ммоль/л). Розчин для ін'єкцій: 5% глюкоза, 0,9% натрію хлорид (еквівалентно 150 ммоль/л Na ⁺ та 150 ммоль/л Cl ⁻); 5% глюкоза, 0,45% натрію хлорид (еквівалентно 75 ммоль/л Na ⁺ та 75 ммоль/л Cl ⁻). [д]
Калію хлорид (Potassium chloride)	Розчин для розведення: 11,2% в 20-мл ампулі (еквівалентно K ⁺ 1,5 ммоль/мл, Cl ⁻ 1,5 ммоль/мл). Розчин для розведення: 15% (еквівалентно K 2 ммоль/мл та Cl 2 ммоль/мл). [д]
Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	Розчин для ін'єкцій 1,4% ізотонічний (еквівалентно Na ⁺ 167 ммоль/л, HCO ₃ ⁻ 167 ммоль/л).
26.3. Змішані	
26.4. Кровозамінники та перфузійні розчини	
26.5. Розчини для парентерального живлення та жирові емульсії	
27. ВІТАМІНИ І МІНЕРАЛИ	
Ергокальциферол (Ergocalciferol)	Тверді оральні лікарські форми: 1,25 мг (50 000 ОД).
Йод (Iodine)	Капсули: 200 мг. Олійний розчин йоду: 1 мл (480 мг йоду); 0,5 мл (240 мг йоду) в ампулі (пероральний або для ін'єкцій); 0,57 мл (308 мг йоду) в дозованій пляшці.
Натрію фторид (Sodium fluoride)	У будь-якій відповідній формі для місцевого застосування.
Піридоксин (Pyridoxine)	Таблетки: 25 мг (гідрохлорид).
Ретинол (Retinol)	Капсули: 50 000 ОД; 200 000 ОД (у вигляді пальмітату). Таблетки (вкриті цукром): 10 000 ОД (як пальмітат). Водо-змішуючий ін'єкційний розчин: 100 000 ОД (як пальмітат) в 2-мл ампулі.
Рибофлавін (Riboflavin)	Таблетки: 5 мг.
Тіамін (Thiamine)	Таблетки: 50 мг (гідрохлорид).
Холекальциферол (Cholecalciferol)* [д]	Оральна рідина: 400 ОД/мл. Тверді оральні лікарські форми: 400 ОД; 1000 ОД.

	* Ергокальциферол може використовуватись, в якості альтернативи.
28. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУХА, ГОРЛА ТА НОСА	
28.1. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа у дітей[д]	
Необхідно переглянути роль антагоністів лейкотрієну при лікуванні алергічних ринітів у дітей	
28.2. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа у дорослих	
Оцтова кислота (Acetic acid)	Місцево: 2%, в спирті.
□Будесонід (Budesonide)	Назальний спрей: 100 мікрограмів на дозу.
Фенол (Phenol)	Спрей для ротової порожнини: по 25 г, 50 мг.
29. СПЕЦІАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА НОВОНАРОДЖЕНИМИ	
29.1. Лікарські засоби, що призначаються немовлятам [д]	
Кофеїну цитрат (Caffeine citrate)	Розчин для ін'єкцій: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну бази/мл). Оральна рідина: 20 мг/мл (еквівалентно 10 мг кофеїну бази/мл).
<i>Додатковий перелік</i>	
Простагландин Е (Prostaglandin E)	Розчин для ін'єкцій: Простагландин Е1 – 0,5 мг/мл в спирті. Простагландин Е2 – 1 мг/мл.
29.2. Лікарські засоби, що призначаються матерям новонароджених	
30. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СУГЛОБІВ	
30.1. Лікарські засоби для лікування подагри	
30.2. Модифікуючі лікарські засоби, що використовуються при ревматичних хворобах (DMARDs)	
Хлорохін (Chloroquine)*	Таблетки: 100 мг; 150 мг (у вигляді фосфату або сульфату).
30.3. Лікування ювенільного артрити	
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid)*	Супозиторії: 50 мг до 150 мг. * Для використання при ревматичній лихоманці, ювенільному артриті, хворобі Кавасакі.

30.4. Лікарські засоби, що впливають на структуру та мінералізацію кісток
--

30.5. Лікарські засоби, що застосовуються при захворюваннях суглобів

Структура та система відповідних індексів Переліку лікарських засобів, які мають увійти до Національного переліку основних лікарських засобів за умови їх реєстрації в Україні відповідають структурі та системі відповідних індексів Національного переліку основних лікарських засобів.
